EJERCICIOS BLOQUE III

REDOX

7) $Au^0 + H_2O_2 \xrightarrow{HCl \rightarrow 0{,}04M} ?$

Sol:

SON 1 REACCIONES:

$2 \times (Au^0 \rightarrow Au^{3+} + 3e^-)$ R. OXID.

$3 \times (H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O)$ R. RED

$2Au^0 + 3H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Au^{3+} + 6H_2O$

$2Au^0 + 3H_2O_2 + 6HCl \rightarrow 2AuCl_3 + 6H_2O$

$E^\circ_{cel} = E^\circ_{cátodo} - E^\circ_{ánodo}$ ($\rightarrow H_2O_2$; $\rightarrow Au$)

$E^\circ_{cel} = 1{,}763\,V - 1{,}498\,V = 0{,}265\,V$

ESP.

¡NO TODAS LAS CONCENTRACIONES ESTÁN A 1 M!

$E_{cel} = E^\circ_{cel} - \frac{0{,}059}{n} \log Q$

(real)

$$E_{cel} = 0,267(V) - \frac{0,059}{3\times 2} \log \frac{(Ag^{3+})^2 \cdot 1 \cdot (H_2O)^6}{Ag^{\circ}_{(s)} \cdot (H_2O_2)^3 \cdot (H^+)^6}$$

$Ag^{\circ}_{(s)}$ → solide ; $(H_2O)^6$ → dissolvant ; $(H^+)^6 = (0,04)^6$

$$E_{cel} = 0,265(V) - \frac{0,059}{6} \log \frac{1}{(0,04)^6}$$

$$E_{cel} = 0,142(V) \quad \text{ESP}$$

EL Ag° SE OXIDA EN H_2O_2 A pH = 1,4,

8) $Ag^{\circ} + KIO_3 \xrightarrow{HCl \to 0,02M} \; ?$

DATOS: $E^{\circ}(Ag^{3+}/Ag^{\circ}) = -1,65V$

$E^{\circ}(IO_3^-/I_2) = 0,21V \rightarrow$ I → $x = +5$

$Ag^{\circ} \rightarrow Ag^{3+} + 3e^-$ OXID.

$12H^+ + 10e^- + 2IO_3^- \rightarrow I_2^{\circ} + 6H_2O$ RED.

$10\,Ag^{\circ} + 36H^+ + 6IO_3^- \rightarrow 10\,Ag^{3+} + 3I_2 + 18H_2O$

$10\,Ag^{\circ} + 36HCl + 6KIO_3 \rightarrow 10\,AgCl_3 + 3I_2 + 18H_2O + 6KCl$

$$E^\circ_{cel} = E^\circ_{cat} - E^\circ_{an} = 0{,}25\ (V) - (-1{,}66(V))$$

$$E^\circ_{cel} = 1{,}91\ V \quad \underline{CSP}$$

$$E_{cel} = E^\circ_{cel} - \frac{0{,}059}{30} \log \frac{(Al^{3+})^{10} (I_2)^3 (H_2O)^{14} (KCl)^6}{(Al)^{10} (HCl)^{30} (KIO_3)^6}$$

(10 sobre Al^{3+}; sólido sobre I_2; dado sobre H_2O; 10 sobre KCl; sólido sobre Al; $(0{,}02)^{30}$ sobre HCl; 30 sobre KIO_3)

$$E_{cel} = 1{,}91\ V - 0{,}12$$

$$E_{cel} = 1{,}79\ V \quad CSP$$

NO ES ESTABLE EL Al EN KIO_3

A $pH = 1{,}7$

9) $Pb^\circ + O_{2(g)} \rightarrow Pb^{2+}_{(ac)}$ ($pH=0$ / $pH=2$)

$Pb^\circ \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$ OXID

$4e^- + O_2^\circ + 4H^+ \rightarrow 2H_2O$ (2) REDUC

$2Pb^\circ + O_2 + 4H^+ \rightarrow 2Pb^{2+} + 2H_2O$ $pH=0$

$$E^\circ_{cel} = E^\circ_{cat} - E^\circ_{an} = 1{,}23\ V - (-0{,}13\ V)$$

$E^\circ_{cel} = 1{,}36\ V$ CSP → SE CONSIDERE A $pH=0$

A $pH = 2 \rightarrow [H^+] = 10^{-2}$ M

$$E_{cel} = 1{,}36\,V - \frac{0{,}059}{2} \log \frac{(PbO_2)^2\,(H_2O)^2}{(Pb^{+4})^2\,(Cl_2)\,(H^+)^4}$$

sólido · 1 atm · $(10^{-2})^4$

$$E_{cel} = 1{,}36\,V - 0{,}236 = 1{,}124\,V$$

SE CONSIGUIÓ TIB A

$pH = 2$