

Ejercicios TMDE - Curso 2018-2019

Aníbal R. Figueiras Vidal
Lorena Álvarez Pérez

Tema 2: “Decisión Analítica”

2.D1 Pruébese que un test MAP de J hipótesis se puede realizar mediante una sucesión de tests LRT binarios de cada hipótesis contra las siguientes.

2.Q1 Un problema de decisión ternario unidimensional con hipótesis equiprobables está definido por las siguientes verosimilitudes:

$$\begin{aligned} p(x|H_0) &= 2(1 - 2|x - \frac{1}{2}|) &, & 0 < x < 1 \\ p(x|H_1) &= 1 &, & 0 < x < 1 \\ p(x|H_2) &= 2x &, & 0 < x < 1 \end{aligned}$$

- Determinése el decisor de mínima probabilidad de error.
- Discútase si el decisor anterior es equivalente al constituido por un primer decisor de mínima probabilidad de error que elige entre H_0 y $H_1 \cup H_2$, y tras ello, caso de aceptar la hipótesis $H_1 \cup H_2$, se aplica un segundo decisor, también de mínima probabilidad de error, para decidir entre H_1 y H_2 .

2.Q2 En un problema de decisión M-aria bidimensional con observaciones $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$, se comprueba que $p(x_1|x_2, H_j)$ no depende de j . Se desea diseñar un decisor ML, aunque se sabe que las probabilidades a priori, $\{Pr(H_j)\}_{j=1,\dots,M}$, son diferentes. Discútase cuál de los siguientes diseños es válido:

a) $j^* = \arg \max_j \{p(x_1|H_j)\}$

b) $j^* = \arg \max_j \{p(x_2|H_j)\}$

c) $j^* = \arg \max_j \{p(x_2, H_j)\}$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

- a) Determinése la forma del decisor de Neyman-Pearson.
- b) Calcúlese el parámetro del decisor para obtener $P_{FA} = 10^{-2}$.
- c) Calcúlese P_D para el diseño hecho en b).

2.Q4 Se conocen las verosimilitudes $\{p(\mathbf{x}|H_i)\}$ de un problema de decisión con tres hipótesis equiprobables $\{H_i\}$, $i = 0, 1, 2$, y dos decisiones posibles $\{D_j\}$, $j = 0, 1$. $\{C_{ji}\}$ es la política de costes.

- a) Determinése el decisor óptimo.
- b) Supóngase que $C_{00} = C_{11} = 0$, $C_{10} = C_{01} = 1$, y $C_{12} = 2C_{02} = 2$. Establézcase el decisor óptimo de umbral (es decir, con la forma $q(\mathbf{x}) \underset{D_0}{\underset{D_1}{\geq}} \eta$)
- c) Considérese el caso particular unidimensional

$$p(x|H_0) = \Lambda(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = L(x|1) = \frac{1}{2} \exp(-|x|)$$

$$p(x|H_2) = \frac{1}{2} \Pi(x|2) = \begin{cases} 1/2, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

bajo las condiciones establecidas en b). Determinése el decisor óptimo en función del valor de x .

2.Q5 Un problema bidimensional de decisión binaria se rige por las verosimilitudes

$$p(x_1, x_2|H_0) = \begin{cases} \frac{1}{4} \exp(-x_1)u(x_1), & -3 < x_2 < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$p(x_1, x_2|H_1) = \begin{cases} \frac{1}{2} \exp(-2x_1)u(x_1), & -1 < x_2 < 3 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

y las probabilidades “a priori” de las hipótesis son iguales.

Determinése el decisor de mínima probabilidad de error.

2.Q6 Las verosimilitudes de las hipótesis en un problema binario son

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



- iii) Calcúlese la probabilidad de error P_{eNP} que en realidad proporciona el test de Neyman-Pearson.
- iv) Determínese el valor de α para el que P_{eNP} se hace mínima.

2.Q7 Justifíquese la validez y descríbese la forma en que se han de aplicar las expresiones generales

$$P_{FA} = \int u [p(\mathbf{x}|H_1) - \eta p(\mathbf{x}|H_0)] p(\mathbf{x}|H_0) d\mathbf{x}$$

$$P_M = \int u [\eta p(\mathbf{x}|H_0) - p(\mathbf{x}|H_1)] p(\mathbf{x}|H_1) d\mathbf{x}$$

en un problema de decisión binaria, siendo η el valor del umbral LRT.

2.Q8 La va x puede ser generada por una de las hipótesis $\{H_i\}$, $i = 0, \dots, I - 1$ ($I > 2$: múltiples). Dichas hipótesis son equiprobables, y sus verosimilitudes son las ddps potenciales

$$p(x|H_i) = \begin{cases} (i+1)x^i, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Establézcase el test de mínima probabilidad de error. (Sugerencia: para deducir su forma, compruébese que las abscisas de corte de las verosimilitudes de dos hipótesis consecutivas son crecientes).
- ii) Determínese la probabilidad de error.
- iii) ¿Qué ocurriría si las probabilidades de las hipótesis pasasen a ser $\text{Pr}'(H_i) = \frac{2^I}{2^{I-1}} \frac{1}{2^i}$?

2.Q9 M clases (exhaustivas y excluyentes) $\{C_m\}$ se manifiestan en una va observable según las verosimilitudes

$$p(x|C_m) = \frac{1}{m} \exp(-x/m) u(x), \quad m = 1, \dots, M$$

Las clases son equiprobables.

- i) Establézcase la regla de clasificación de mínima probabilidad de error.
 - ii) Determínese la expresión de dicha probabilidad de error.
 - iii) ¿Cómo se modificarían los resultados anteriores si las clases fuesen $M + 1$?
- 2.Q10** H_0 y H_1 son dos sucesos deterministas. No puede observarse cuál es el que acontece, pero sí una va x relacionada con ellos según las verosimilitudes:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

iii) En realidad, la verosimilitud de H_1 es

$$p_c(x|H_1) = \frac{1}{2} \exp(-x/2)u(x)$$

y la de H_0 , la anteriormente indicada.

Determinése la OC cuando se emplea el test anteriormente diseñado, $P'_D(\alpha)$. Coméntese el resultado.

iv) Determinéense el test N-P correcto y la correspondiente OC para la situación descrita en iii). Coméntese el resultado.

2.Q11 En un problema bidimensional de test de hipótesis éstas son cuatro y equiprobables. Sus verosimilitudes siguen las expresiones

$$p(\mathbf{x}|H_{00}) = \frac{1}{4} \exp \left[- (|x_1 + 1| + |x_2 + 1|) \right]$$

$$p(\mathbf{x}|H_{01}) = \frac{1}{4} \exp \left[- (|x_1 + 1| + |x_2 - 1|) \right]$$

$$p(\mathbf{x}|H_{10}) = \frac{1}{4} \exp \left[- (|x_1 - 1| + |x_2 + 1|) \right]$$

$$p(\mathbf{x}|H_{11}) = \frac{1}{4} \exp \left[- (|x_1 - 1| + |x_2 - 1|) \right]$$

(Se presentan los índices en binario para facilitar la visualización y el análisis).

- i) Determinése el test de mínima probabilidad de error.
- ii) Calcúlese dicha probabilidad de error.

2.E1 Considérese el problema de decisión binaria descrito por:

$$p(x|H_1) = a \exp(-ax)u(x) \quad (a > 0)$$

$$p(x|H_0) = \begin{cases} a/2, & 0 < x < 2/a \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Diseñese el decisor ML
- b) Calcúlese P_{FA} y P_M
- c) Si el decisor que se ha diseñado en a) se aplica a una situación en la que la verosimilitud de las observaciones supuesta H_0 es en realidad

$$p'(x|H_0) = \begin{cases} a/4, & 0 < x < 4/a \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



siendo $s > 0$ una constante conocida, y estando el ruido n caracterizado por

$$p(n) = \begin{cases} \frac{1}{s} \left(1 - \frac{|n|}{s}\right), & |n| < s \\ 0, & |n| > s \end{cases}$$

Las probabilidades de las hipótesis son $\Pr(H_0) = 1/3$, $\Pr(H_1) = 2/3$.

- Establézcase el decisor MAP
- Calcúlense las correspondientes P_{FA} y P_M , así como la probabilidad de error
- Calcúlese cuánto variarían las anteriores probabilidades si se aplicase a esta situación el mismo tipo de decisor pero diseñado suponiendo que n fuese gaussiano con igual varianza que el ruido verdaderamente presente (y media también nula).

2.E3 Considérese un problema bidimensional de decisión binaria con verosimilitudes

$$p(x_1, x_2 | H_1) = \begin{cases} a(x_1^2 + x_2^2), & x_1^2 + x_2^2 \leq 1/4 \text{ y } x_1, x_2 \geq 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$p(x_1, x_2 | H_0) = \begin{cases} b, & x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \text{ y } x_1, x_2 \geq 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Diséñese el decisor MAP correspondiente. Discútanse las formas de las regiones de decisión en función de los márgenes de valores del parámetro $c = \Pr(H_0)/\Pr(H_1)$.
- Calcúlense P_{FA} , P_M y P_e cuando $\Pr(H_0) = 2/3$.

2.E4 Considérese el problema de detección

$$H_1 : \mathbf{x} = \mathbf{m} + \mathbf{r}$$

$$H_0 : \mathbf{x} = \mathbf{r}$$

donde \mathbf{m} es un vector N -dimensional conocido y \mathbf{r} un vector de N muestras independientes, la n -ésima distribuida como gaussiana de media 0 y varianza v_n

- Diséñese el detector ML
- Determinense P_{FA} y P_D en función de los datos del problema (\mathbf{m} y \mathbf{v}), expresándolas mediante la función

$$\text{erfc}(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\infty} \exp(-t^2/2) dt$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

d es una constante positiva y r sigue una distribución $\Gamma(\alpha, a)$

$$p(r) = \frac{a^\alpha}{\Gamma(\alpha)} r^{\alpha-1} \exp(-ar) u(r), \quad a > 0$$

con $\alpha > 1$.

- i) Previa representación de las verosimilitudes, diseñese el decisor ML.
- ii) Indíquese si el umbral de decisión se acerca o aleja relativamente de $x = d$ al variar cada uno de los parámetros del problema (d, a, α).
- iii) Discútase como varían las prestaciones del decisor óptimo según los valores de los parámetros.
- iv) Verifíquese la degradación de la decisión si se emplea el diseño óptimo para un valor $\alpha' \neq \alpha$.

2.E7 Considérese el problema de decisión binaria

$$H_1 : x = \mathbf{s}_1^T \mathbf{r}$$


$$H_0 : x = \mathbf{s}_0^T \mathbf{r}$$

donde \mathbf{s}_i son vectores conocidos, y \mathbf{r} es un ruido multiplicativo gaussiano N -dimensional de media nula y matriz de covarianzas V

$$p(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} |V|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{r}\right)$$

- i) Diseñese el decisor ML.
- ii) Suponiendo que $v_1 > v_0$, determinar cualitativamente cómo se comportan P_{FA} y P_M si se aplica a la situación anterior un decisor ML diseñado suponiendo que la matriz de covarianzas es V' . ¿Puede mejorar la probabilidad total de error? (Admítanse iguales probabilidades a priori).

2.E8 El conmutador de la figura se encuentra en su posición superior ("1") con probabilidad conocida P . La variable aleatoria x tiene una densidad de probabilidad uniforme $U(0, 1)$.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

(Sugerencia: para determinar $p(y)$, relaciónense las funciones de distribución de y y de x).

2.E9 Se ha de decidir por máxima verosimilitud si una cierta variable aleatoria x de media nula y varianza v sigue una densidad de probabilidad gaussiana o laplaciana (exponencial bilateral) a partir de K medidas $\{x^{(k)}\}$ de dicha variable tomadas independientemente,

a) Dada la forma habitual de la densidad de probabilidad laplaciana

$$p(x) = \frac{a}{2} \exp(-a|x|) \quad (a > 0)$$

presentar esta densidad de probabilidad en función de su varianza v .

b) Establézcase el decisor necesario, tomando la gaussianidad como H_1 .

c) Resuélvase el problema determinando umbrales para $K = 1$.

d) A la vista del resultado de c), discútase el efecto de las muestras en el caso general según su tamaño respecto a la desviación típica.

2.E10 Se lanza al aire un dado tradicional (caras con puntos de 1 a 6) y se genera la v.a. x tal que

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2}{a} \left(1 - \frac{x}{a}\right), & 0 < x < a \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

de modo tal que su media viene dada por el resultado del lanzamiento (es igual a los puntos que muestra la cara de arriba).

Supóngase que, para una tirada, se tiene acceso a 3 medidas del valor de x tomadas independientemente, de valores $x^{(1)} = 2, x^{(2)} = 5, x^{(3)} = 10$. Decídase a partir de ellas el resultado del lanzamiento del dado según el criterio de máxima verosimilitud.

2.E11 Se desea clasificar objetos que pertenecen a una de dos clases, H_0 y H_1 , mediante la consideración de dos de sus dimensiones, x_1 y x_2 , estadísticamente independientes entre sí y cuyas verosimilitudes son:

$$p(x_1|H_0) = \begin{cases} 1 - \frac{x_1}{2}, & 0 < x_1 < 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad ; \quad p(x_1|H_1) = \begin{cases} \frac{x_1}{2}, & 0 < x_1 < 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$p(x_2|H_0) = \begin{cases} 1, & 0 < x_2 < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad ; \quad p(x_2|H_1) = \begin{cases} 1, & 1 < x_2 < 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Las clases son equiprobables y los costes de ambos tipos de errores de clasificación son unitarios. De otro lado, el coste de medir x_1 es despreciable, pero el de medir x_2 es C_M .

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- b.1) Determínese el umbral de decisión para el primer paso.
- b.2) Calcúlese la probabilidad de que se tome una decisión en un solo paso, $Pr(1)$.
- b.3) Considerando la probabilidad anterior y los costes medios correspondientes a decidir en un paso y a decidir en dos, calcúlese el coste medio de la clasificación secuencial, C_S .
- b.4) Discútase la mejor elección del parámetro γ . ¿Hay alguna limitación sobre el valor de C_M ?

2.E13 Un juego consiste en una sucesión indefinida de jugadas en las que el primer jugador lanza una moneda equilibrada y, tras ver el resultado (cara: H_1 ; cruz: H_0), establece el importe de la apuesta, x ($x > 0$). El segundo jugador puede aceptar o no la apuesta; si la acepta, lanza la moneda: la cara gana a la cruz, y el empate no tiene consecuencias. En una partida, el segundo jugador sabe que las apuestas del primero siguen las leyes probabilísticas:

$$p(x|H_i) = \begin{cases} 1, & |x - m_i| < 1/2 \\ 0, & |x - m_i| > 1/2 \end{cases} \quad 1/2 < m_0 \leq m_1 < m_0 + 1$$

y conoce también los valores de m_0 y m_1 .

- a) Calcúlese el beneficio medio (importe de la apuesta por la probabilidad de ganarla menos la probabilidad de perderla) a la vista de x para el segundo jugador.
- b) Considerando el resultado del apartado anterior, establézcase la regla de decisión para aceptar o rechazar la apuesta que ha de aplicar el segundo jugador para maximizar su beneficio.
- c) Calcúlese el beneficio medio del segundo jugador cuando sigue la regla determinada en el apartado anterior.
- d) Indíquese como debe elegir m_1 y m_0 el primer jugador para minimizar sus pérdidas. Coméntese el resultado.

2.E14 Un problema de decisión binaria bidimensional viene caracterizado por la equiprobabilidad de las hipótesis y por las verosimilitudes

$$p(x_1, x_2|H_0) = K_0 x_1(1 - x_2) \quad , \quad 0 < x_1, x_2 < 1$$

$$p(x_1, x_2|H_1) = K_1 x_1 x_2 \quad , \quad 0 < x_1, x_2 < 1$$

($K_0, K_1 > 0$)

- a) Calcúlense los valores de las constantes K_0 y K_1 .
- b) Establézcase el decisor de mínima probabilidad de error, e indíquese el carácter de los estadísticos x_1 y x_2 .

c) Determínese el coste medio de la clasificación para el primer jugador cuando sigue la regla determinada en el apartado anterior.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

f) Calcúlese P'_{FA} , P'_M y P'_e para la situación y el diseño del apartado anterior.

2.E15 Considérese un problema de decisión binaria unidimensional en el que las verosimilitudes sigan ddps Rayleigh

$$p(x|H_i) = a_i^2 x \exp(-a_i^2 x^2 / 2) u(x)$$

$i = 0, 1$; siendo $a_0^2 > a_1^2$.

a) Demuéstrese que, si $(a_0/a_1)^2 \eta > 1$, siendo η el umbral del LRT, éste se reduce a un test de umbral aplicado sobre la v.a. observada x :

$$x \underset{D_0}{\overset{D_1}{\geq}} U$$

determinando la expresión de U en función de a_0^2 , a_1^2 y η . ¿Qué ocurre si $(a_0/a_1)^2 \eta < 1$?

b) Considérense los parámetros característicos del decisor:

- especificidad: $E = Pr(D_0|H_0)$

- sensibilidad: $S = Pr(D_1|H_1)$

Calcúlese sus valores en función de los parámetros del sistema.

c) Como se sabe, es posible elegir un valor de U para conseguir un cierto compromiso entre S y E . Suponiendo que se procede así, establézcase la expresión analítica de la curva (tipo OC) S vs E , y represéntese de forma aproximada. Indíquese cómo se comporta la curva cuando $(a_1/a_0)^2 \rightarrow 0$ y cuando $(a_1/a_0)^2 \rightarrow 1$.

d) ¿Qué ocurre si $a_1^2 > a_0^2$?

2.E16 Las verosimilitudes de las hipótesis de un problema de decisión binaria con observaciones unidimensionales son:

$$p(x|H_0) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1-x), & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1+x), & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

y las hipótesis son equiprobables.

a) Establézcase el decisor MAP (ML) en forma de umbral.

b) Calcúlese P_{FA} , P_M y P_e .

c) Un desajuste del sensor hace que las observaciones pasen a ser

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- e) Calcúlese P''_{FA} , P''_M y P''_e para el decisor determinado en d). Discútanse los resultados.
 f) Un nuevo desajuste de los sensores lleva a observar

$$z = \begin{cases} x, & x > 0 \\ -x/2, & x < 0 \end{cases}$$

¿Qué valores corresponden a P'''_{FA} , P'''_M y P'''_e si se sigue aplicando el decisor establecido en a)?

- g) De nuevo, el diseñador sigue el proceso indicado en d), y encuentra el desajuste expuesto en f). ¿Cuál será el resultado de su rediseño?
 h) Calcúlese P'^V_{FA} , P'^V_M y P'^V_e para el último rediseño. Discútanse los resultados.

2.E17 En un problema de decisión binaria bajo situación de hipótesis equiprobables y $C_{00} = C_{11} = 0$, $C_{01} = 2C_{10}$, la verosimilitud de H_1 es la Erlang

$$p(x|H_1) = \frac{x^2}{2} \exp(-x)u(x)$$

y la de H_0 es la Weibull

$$p(x|H_0) = x^2 \exp(-x^3/3)u(x)$$

- Establézcase el decisor.
- Calcúlese P_{FA} , P_M y P_e .
- En realidad, la verosimilitud de H_0 es la Weibull antes indicada para la variable $y = \sqrt[3]{3x}$. Calcúlese P'_{FA} , P'_M y P'_e si se aplica el decisor que se ha establecido.
- El diseñador se da cuenta de lo indicado en iii) y corrige el diseño del decisor. Indíquese cuál es este nuevo diseño.
- Calcúlese P''_{FA} , P''_M y P''_e para el diseño corregido.

2.E18 Las probabilidades a priori de un problema de decisión binaria son $\Pr(H_0) = 4/5$, $\Pr(H_1) = 1/5$, y las verosimilitudes:

$$p(x|H_1) = \exp(-x)u(x)$$

$$p(x|H_0) = 2 \exp(-2x)u(x)$$

- Diséñese el decisor de mínima probabilidad de error.
- Calcúlese P_{FA} , P_M y P_e .
- Una avería en el sensor que lee los valores de la va x hace que se maneje $y = \sqrt{x}$. Determinense los nuevos valores P'_{FA} , P'_M y P'_e si no se modifica el diseño realizado.
- Se pretende compensar el defecto del sensor introduciendo la transformación $z = 0.0x^2$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



con $a_0 > a_1 > a_2 > 0$. La hipótesis H_0 corresponde a ausencia de una señal, mientras que $H_1 \cup H_2 = \bar{H}_0$ implica su presencia.

- a) No se conocen las probabilidades a priori de las hipótesis, por lo que se adopta el criterio de Neyman-Pearson, fijando la probabilidad de falsa alarma $P_{FA} = Pr(D_1 \cup D_2|H_0) = Pr(\bar{D}_0|H_0)$ en un cierto valor α .
 - a1) Establézcase el decisor correspondiente.
 - a2) Calcúlense $Pr(D_1 \cup D_2|H_1)$ y $Pr(D_1 \cup D_2|H_2)$.
- b) Para distinguir H_1 de H_2 , se recurre a una segunda aplicación del criterio de Neyman-Pearson, forzando que $Pr(D_2|H_1)$ tome el valor α' , que se elige para no provocar inconsistencias.
 - b1) Determínese el mecanismo a aplicar para conseguirlo.
 - b2) Indíquese cómo ha de elegirse α' para que este sistema, combinado con el diseñado en a), no produzca inconsistencias.
 - b3) Calcúlense $\{Pr(D_j|H_i)\}$, $i, j = 0, 1, 2$, cuando se aplican conjuntamente ambos sistemas.
- c) En realidad, $Pr(H_1|H_1 \cup H_2) = Pr(H_2|H_1 \cup H_2)$. Calcúlese la probabilidad real de detección de señal, P_D .
- d) Además de lo dicho en c), en realidad $Pr(H_0) = 9/10$ y $Pr(H_1 \cup H_2) = 1/10$. Calcúlese la probabilidad de error asociada al sistema conjunto, $Pr(e) = Pr(D_1 \cup D_2|H_0)Pr(H_0) + Pr(D_0|H_1 \cup H_2)Pr(H_1 \cup H_2)$.

2.E20 Dos hipótesis equiprobables dan lugar a observaciones unidimensionales según las verosimilitudes

$$p(x|H_1) = \exp(-x)u(x)$$

$$p(x|H_0) = 2 \exp(-2x)u(x)$$

- i) Establézcase el decisor de mínima probabilidad de error, y calcúlense sus P_{FA} y P_M .
- ii) Resulta posible tomar - independientemente una de otra - tres observaciones, $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, $x^{(3)}$, de la variable x bajo la hipótesis que se esté produciendo. Establézcase el decisor de mínima probabilidad de error utilizando conjuntamente las tres, y calcúlense sus probabilidades de falsa alarma y de pérdida, P_{FA3} y P_{M3} .
- iii) Se implementa un decisor que procede según la mayoría de los tres decisores óptimos individuales aplicados a $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, $x^{(3)}$. Calcúlense sus probabilidades de falsa alarma y de pérdida, $P_{FA(M3)}$ y $P_{M(M3)}$. Cuantifíquese la degradación respecto al decisor óptimo encontrado en ii).

2.E21 Es posible plantear el diseño óptimo de decisores con arquitecturas limitadas, como la lineal, aunque su aplicación práctica no resulta habitual (disponiendo de toda la información para

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

$$p(x_1, x_2|H_1) = \frac{cd}{2} \exp(-c|x_1|) \exp(-d x_2)$$

en el dominio $-\infty < x_1 < \infty$, $0 < x_2 < \infty$; $a > c > 0$, $b > d > 0$. La política de costes corresponde al criterio MAP.

- i) Diseñese el decisor óptimo, y represéntese la forma de su frontera en el plano (x_1, x_2) .
- ii) Justifíquese que la forma del decisor lineal óptimo es $x_2 + w_0 \underset{D_0}{\overset{D_1}{\geq}} 0$.
- iii) Diseñese el decisor lineal óptimo calculando los valores de P_{FA} y P_M .

Se adopta ahora el criterio de Neyman-Pearson, obligando a que la probabilidad de falsa alarma sea $P'_{FA} = \alpha$.

- iv) Diseñese el correspondiente decisor lineal, calculando P'_M .
- v) ¿En qué forma variará la frontera del decisor óptimo diseñado en i) cuando se aplique este nuevo criterio?

2.E22 Las verosimilitudes de un problema de decisión binaria son:

$$p(x|H_1) = a \exp(-ax)u(x)$$

$$p(x|H_0) = b \exp(-bx)u(x)$$

con $b > a > 0$.

- i) Establézcase el decisor ML óptimo.
- ii) Calcúlense las características de calidad P_{FA} y P_M de dicho decisor.
- iii) En la lectura de los valores de x se produce una saturación, de modo que se maneja realmente

$$y = \begin{cases} x, & 0 < x < m \\ m, & x > m \end{cases}$$

Calcúlense los nuevos valores de las características de calidad, P'_{FA} y P'_M , si no se modifica el diseño anterior.

- iv) Establézcase el decisor ML óptimo para el problema planteado con y como variable observada.
- v) Calcúlense P''_{FA} y P''_M para el segundo diseño.

2.E23 Las verosimilitudes de las hipótesis de un problema bidimensional de decisión binaria son

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

ii) Calcúlese P_{FA} , P_M y P_e .

2.E24 En una situación de decisión binaria caracterizada por las verosimilitudes

$$p_X(x|H_0) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p_X(x|H_1) = \begin{cases} 1/2, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

y la equiprobabilidad de las hipótesis, el aparato de registro de valores lleva a cabo una indebida rectificación de media onda, de modo que se observa

$$y = \begin{cases} x, & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- i) Establézcase el decisor MAP para y observada, sorteando entre D_1 y D_0 de forma equiprobable en casos de empate.
- ii) Calcúlese P_{FA} , P_M y P_e para el diseño anterior, comparándolas con los valores P_{FA0} , P_{M0} y P_{e0} que correspondería al decisor MAP para x observada.
- iii) Propóngase un mecanismo para recuperar el valor P_{FA0} cuando se observa y . ¿Cuánto se degradan P_M y P_e al aplicarlo?

2.E25 Cuatro hipótesis equiprobables dan lugar a verosimilitudes bidimensionales con formas

$$p(\mathbf{x}|H_1) = x_1/4$$

$$p(\mathbf{x}|H_2) = x_2/4$$

$$p(\mathbf{x}|H_3) = (2 - x_1)/4$$

$$p(\mathbf{x}|H_4) = (2 - x_2)/4$$

en $0 < x_1, x_2 < 2$, y nulas fuera de ese recinto.

Se establece un juego probabilístico en el que el jugador gana G si a la vista de \mathbf{x} acierta la hipótesis verdadera y pierde P si falla ($G, P > 0$).

- i) Establézcase la regla de decisión que ha de seguir el jugador para maximizar su beneficio medio.
- ii) Determínese la relación que ha de existir entre G y P para que el juego sea equitativo (iguales pérdidas y ganancias, en media).

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a background of a light blue and white gradient with a subtle, abstract shape.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- i) Establézcase el test MAP con la observación x , y calcúlense P_{FA} , P_M y P_e .

Un error en el proceso de medida provoca que se observe

$$y = \begin{cases} x & , \quad 0 < x < 1 \\ x - 1, & \quad 1 < x < \infty \end{cases}$$

- ii) Previa determinación de las verosimilitudes $p_Y(y|H_0)$, $p_Y(y|H_1)$, establézcase el test MAP dada la observación y .
 iii) Calcúlense P'_{FA} , P'_M y P'_e (características del test MAP establecido en ii)).
 iv) Explíquese la razón de que el segundo test se degrade respecto al inicial.

2.E27 Un problema de decisión binaria con hipótesis equiprobables se rige por las verosimilitudes

$$p(x|H_0) = \frac{1}{2} \exp(-|x|)$$

$$p(x|H_1) = p(x - 2d|H_0)$$

siendo $d > 0$ un parámetro determinista.

- i) Determinése el decisor MAP y calcúlese la correspondiente probabilidad de error, P_e .

Las hipótesis continúan siendo equiprobables, pero las verosimilitudes pasan a ser

$$p'(x|H_0) = \frac{1}{2} \frac{c}{(1 + |x|)^{c+1}}$$

$$p'(x|H_1) = p'(x - 2d|H_0)$$

siendo $c > 0$ un valor conocido.

- ii) Establézcanse el decisor MAP y el valor de la probabilidad de error, P'_e .
 iii) Considérese el cociente $Q(c, d) = P'_e/P_e$. ¿En qué márgenes de valores de d es mayor/menor que 1? Discútase el sentido de las correspondientes condiciones, y determinése $d^* = \arg \min_d Q(c, d)$.

2.E28 Un diseñador analiza un problema bidimensional de decisión binario cuyas hipótesis son equiprobables y lo caracteriza mediante las verosimilitudes:

$$p(x_1, x_2|H_1) = 32 x_1 x_2 \exp [-(x_1^2 + 8x_2^2)] u(x_1)u(x_2)$$

$$p(x_1, x_2|H_0) = 32 x_1 x_2 \exp [-(2x_1^2 + 4x_2^2)] u(x_1)u(x_2)$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

El diseñador mide las probabilidades de falsa alarma y pérdida de su decisor y encuentra discrepancias con los valores teóricos. Revisa su modelo para las verosimilitudes del problema, y encuentra que realmente son

$$p'(x_1, x_2|H_1) = \frac{16}{\sqrt{\pi}} x_2 \exp[-(x_1^2 + 4x_2^2)] u(x_1)u(x_2)$$

$$p'(x_1, x_2|H_0) = \frac{16\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} x_2 \exp[-(2x_1^2 + 4x_2^2)] u(x_1)u(x_2)$$

- iii) Calcúlese los valores $P_{FA(m)}$ y $P_{M(m)}$ que estaba midiendo el diseñador.
- iv) Determínese el decisor óptimo que corresponde a la situación real.
- v) Calcúlese los valores $P_{FA(r)}$ y $P_{M(r)}$ que corresponden a este último decisor.

2.E29 Las verosimilitudes de dos hipótesis equiprobables para la observación x son

$$p(x|H_0) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Determínese el test MAP.
- ii) Calcúlese P_{FA} , P_M y P_e .
- iii) El test MAP se implementa en la forma

$$x < U \Rightarrow D_0$$

$$x > U \Rightarrow D_1$$

sin ninguna otra precaución. Antes de llegar a dicha implementación, x sufre una interferencia i aditiva de carácter impulsivo independiente de x que sigue la ddp

$$p_I(i) = \frac{1}{3} [\delta(i+1) + 2\delta(i)]$$

cuando la hipótesis cierta es H_1 , y ninguna alteración bajo H_0 .

Calcúlese P'_{FA} , P'_M y P'_e para esta situación.

- iv) ¿Cuál sería el test óptimo para la situación descrita en iii)?
- v) Calcúlese P''_{FA} , P''_M y P''_e para el test óptimo ante la interferencia.
- vi) ¿Cómo sería el test óptimo si esa misma interferencia afecta a x también bajo H_0 ?
- v) Calcúlese P'''_{FA} , P'''_M y P'''_e , para el test óptimo ante la interferencia común.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- i) Determínese el decisor MAP a la vista de x_1, x_2 , representando gráficamente la frontera.
- ii) Calcúlense P_{FA}, P_M y P_e .

Antes de que sea posible aplicar el decisor, las variables se ven sometidas a la transformación:

$$y_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

$$y_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2)$$

- iii) Determínese el decisor MAP a la vista de y_1, y_2 , representando gráficamente la frontera.
- iv) ¿Cuáles serán los valores P'_{FA}, P'_M y P'_e para este decisor?

2.E31 Se testan dos hipótesis equiprobables cuyas verosimilitudes son

$$p(\mathbf{x}|H_0) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi v}} \exp \left[- \left(\frac{x_1^2}{8v} + 2|x_2| \right) \right]$$

$$p(\mathbf{x}|H_1) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi v}} \exp \left[- \left(\frac{x_1^2}{2v} + |x_2| \right) \right]$$

- i) Determínese el test de mínima probabilidad de error.
- ii) Calcúlense P_{FA}, P_M y P_e .

Si no se tiene acceso a los valores de x_1 , ha de diseñarse el test considerando sólo x_2 . En tal situación:

- iii) Determínese el test de mínima probabilidad de error.
- iv) Calcúlense P_{FA2}, P_{M2} y P_{e2} . Coméntese los resultados en comparación con los de ii).

2.E32 Dos hipótesis se manifiestan en las vva observables x_1, x_2 , según las verosimilitudes

$$p(x_1, x_2|H_0) = a^3 x_2 \exp [-a(x_1 + x_2)] u(x_1)u(x_2)$$

$$p(x_1, x_2|H_1) = a^3 x_1 \exp [-a(x_1 + x_2)] u(x_1)u(x_2)$$

($a > 0$).

- i) Establézcase el test de Neyman-Pearson y el valor de su umbral λ para probabilidad de falsa alarma P_{FA} .
- ii) Determínese la expresión de P_D en función de P_{FA} (ecuación de la característica de operación, OC).



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- coste d , $0 < d < 0.5$, si se declara D (“duda”).
- a) Diseñese el correspondiente decisor bayesiano en función de las probabilidades “a posteriori” (para lo que debe considerarse que hay tres posibles decisiones (D_0 , D_1 y D), y que debe elegirse, a la vista de \mathbf{x} , la que implique menor coste).
Exprésese el mecanismo de decisión por máximos.
¿Qué implicaría $d > 0.5$?
- b) Supóngase un caso unidimensional con $\Pr(H_i) = 1/2$, ($i = 0, 1$) y $p(x|H_i)$ gaussiana de media m_i ($m_1 > m_0$) y varianza v . Imponiendo las condiciones del decisor bayesiano con “duda” diseñado en a) a las probabilidades “a posteriori”, exprésese tal decisor en función de x (mediante la aplicación de umbrales).

2.A2 En muchos problemas prácticos de decisión los costes dependen de las observaciones (problemas “cost sensitive”), es decir, tienen la forma $C(D_j|\mathbf{x}, H_i) = C_{ji}(\mathbf{x})$.

Considérese el caso particular unidimensional binario en que $C_{11}(x) = -Gx$, $C_{10}(x) = Px$ y $C_{01} = C_{00} = 0$, con $G, P > 0$, siendo las observaciones positivas ($x > 0$).

- i) Compruébese que el decisor bayesiano tiene la forma de un LRT convencional (para costes fijos), determinando el valor del umbral.

Considérese que, además,

$$p(x|H_1) = \begin{cases} x/2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p(x|H_0) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

siendo los valores de los parámetros

$$G = 1, \quad P = 4.95 \cdot 10^{-2}$$

$$\Pr(H_0) = 10^{-2}, \quad \Pr(H_1) = 0.99$$

- ii) Establézcase el test bayesiano correspondiente a esta situación particular.
- iii) Calcúlese el beneficio medio por instancia para el test bayesiano, $\bar{B}_{\text{opt}} = -\bar{C}_{\text{opt}}$.
- iv) Establézcase el test MAP para la misma situación.
- v) Calcúlese el beneficio medio por instancia para el test MAP, $\bar{B}_{\text{MAP}} = -\bar{C}_{\text{MAP}}$.

Supóngase ahora que los parámetros del problema tienen los valores

$$G' = 1, \quad P' = 4.5 \cdot 10^{-1}$$

$$\Pr'(H_0) = 0.1, \quad \Pr'(H_1) = 0.9$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Tema 3: “Estimación”

3.Q1 Considérese la variable aleatoria x con ddp

$$p(x) = a \exp [-a(x - d)]u(x - d)$$

con parámetros $a > 0$ y d .

Establézcanse las expresiones de los estimadores de máxima verosimilitud de ambos parámetros, \hat{a}_{ML} y \hat{d}_{ML} , en función de los valores de K muestras de x tomadas independientemente, $\{x^{(k)}\}_{k=1}^K$.

3.Q2 La va x tiene como ddp

$$p_X(x) = \begin{cases} 1/a, & 0 < x < a \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

siendo a un parámetro conocido. Se aplica la transformación

$$y = \text{th}(bx)$$

donde $b > 0$ es un parámetro desconocido.

- Determinése la ddp $p_Y(y)$.
- Obténgase el estimador ML del parámetro b , \hat{b}_{ML} , a partir de K observaciones de y tomadas independientemente unas de otras, $\{y^{(k)}\}_{k=1}^K$.

3.Q3 En el proceso de estimación de un parámetro determinista m inmerso en un ruido aditivo n con distribución $G(n|0, v)$, m está también afectado por un ruido multiplicativo n' independiente de n y con distribución $G(n'|m', v')$; es decir, las K muestras tomadas independientemente tienen la forma

$$x^{(k)} = n'^{(k)}m + n^{(k)}$$

pero el analista no lo advierte y aplica el estimador ML que correspondería a la situación sin ruido multiplicativo:

$$x^{(k)} = m + n^{(k)}$$

- Determinése el estimador que aplica el analista, \hat{m}_{fML} .
- Establézcase el estimador ML que corresponde a la situación real, \hat{m}_{ML} .
- Calcúlense y compárense los sesgos y varianzas de ambos estimadores.

3.Q4 Las vvaas s_1, x_1, x_2 siguen la ddp conjunta

$$\left[\frac{a^3}{\pi} \exp[-a(s + x_1 + x_2)] + \frac{b^3}{\pi} \exp[-b(s + x_1 + x_2)] \right], \quad s, x_1, x_2 > 0$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

3.Q5 Se aplica la transformación

$$y = \tanh(\alpha x) = \frac{\exp(\alpha x) - \exp(-\alpha x)}{\exp(\alpha x) + \exp(-\alpha x)}, \quad \alpha > 0$$

a la va x con ddp

$$p_X(x) = \exp(-x)u(x)$$

- Determinése $p_Y(y)$.
- Calcúlese el estimador ML del parámetro α , $\hat{\alpha}_{ml}$, a partir de K valores de y tomados de forma independiente, $\{y^{(k)}\}$.

3.Q6 Un sistema añade a la señal de entrada una componente m y, tras ello, amplifica el resultado con una ganancia a (sin cambio de polaridad: $a > 0$). Los parámetros (deterministas) m y a son desconocidos.

Para estimar m y a , se inyecta al sistema un ruido gaussiano x de media 0 y varianza v conocida. Se toman K muestras de la salida de modo independiente, $\{y^{(k)}\}_{k=1}^K$.

Calcúlense los estimadores de máxima verosimilitud de m y a , \hat{m}_{ml} y \hat{a}_{ml} .

3.Q7 Se dispone de K muestras tomadas de manera independiente, $\{x^{(k)}\}$, de la v.a. potencial

$$p(x|a, b) = \frac{b+1}{a^{b+1}} x^b, \quad 0 < x < a$$

($b > -1$). Calcúlense \hat{a}_{ml} y \hat{b}_{ml} , en función de dichas muestras.

3.Q8 En algunas situaciones prácticas, se dispone únicamente de conjuntos truncados de muestras; es decir, no se puede acceder a muestras que toman valores en determinada región del espacio de observación.

Considérese el siguiente ejemplo.

La v.a. x con ddp

$$p_x(x) = a \exp(-ax) u(x), \quad a > 0$$

no puede ser observada para valores de x mayores que $x_0 (> 0)$. Se toman K muestras independientes de los valores accesibles, $\{x^{(k)}\}_{k=1}^K$.

- ¿Cuál es la ddp de los valores accesibles, $p_{x'}(x)$?
- Establézcase la ecuación no lineal que tiene como solución el estimador ML del parámetro

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

se produce una distorsión, registrándose

$$y = x + ax^2 \operatorname{sgn}(x)$$

con $a > 0$.

Obtégase $\hat{a}_{ml}(\{y^{(k)}\})$, siendo $\{y^{(k)}\}$ K muestras tomadas de forma independiente.

3.Q10 Un sensor de toma de muestras produce un efecto de saturación sobre la entrada x , proporcionando una salida y tal que

$$y = \begin{cases} x, & x < c \\ c, & x \geq c \end{cases}$$

El sensor registra los valores tomados de forma independiente

$$y^{(1)} = 1.186; \quad y^{(2)} = 1.070; \quad y^{(3)} = 2.312; \quad y^{(4)} = 1.814; \quad y^{(5)} = 2.312 \\ y^{(6)} = 1.978; \quad y^{(7)} = 2.312; \quad y^{(8)} = 2.004; \quad y^{(9)} = 2.312; \quad y^{(10)} = 1.566$$

y se sabe que la v.a. x sigue la d.d.p. uniforme

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

con $a < c < b$.

- i) Dedúzcase el valor de c .
- ii) Determínense \hat{a}_{ml} y \hat{b}_{ml} , recordando que la estimación ML de la probabilidad de un suceso discreto es su frecuencia relativa.

Se sustituye el sensor por otro sin defecto, y se toman otras 10 muestras de forma independiente:

$$x^{(1)} = 1.733; \quad x^{(2)} = 1.286; \quad x^{(3)} = 2.844; \quad x^{(4)} = 2.413; \quad x^{(5)} = 1.675 \\ x^{(6)} = 3.070; \quad x^{(7)} = 1.472; \quad x^{(8)} = 2.216; \quad x^{(9)} = 2.302; \quad x^{(10)} = 1.369$$

- iii) Considerando ambos conjuntos de muestras, determínense los estimadores ML de a y b , \hat{a}_{2ml} y \hat{b}_{2ml} .

3.Q11 Las vv.aa. x, y , se distribuyen conjuntamente según

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a background of a light blue and white abstract shape that resembles a stylized 'C' or a wave.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

3.Q12 Un analista dispone de las muestras $\{x^{(k_1)}\}$, $1 \leq k_1 \leq K_1$, $\{y^{(k_2)}\}$, $1 \leq k_2 \leq K_2$, tomadas independientemente unas de otras, de dos vvaas x e y independientes entre sí, cuyas ddp dependen de un parámetro determinista común d : $p_X(x|d)$, $p_Y(y|d)$, respectivamente:

- i) Establézcase la fórmula general que proporciona \hat{d}_{ml} a partir de los valores de dichas muestras.
- ii) Discútase si es posible en general obtener \hat{d}_{ml} combinando linealmente los estimadores ML del parámetro d a partir de $\{x^{(k_1)}\}$, \hat{d}_{1ml} , y de $\{y^{(k_2)}\}$, \hat{d}_{2ml} .
- iii) Obténganse \hat{m}_{ml} , \hat{m}_{1ml} y \hat{m}_{2ml} para el caso particular

$$p_X(x|m) = \frac{1}{m} \exp\left(-\frac{x}{m}\right) u(x)$$

$$p_Y(y|m) = \frac{1}{2m} \exp\left(-\frac{y}{2m}\right) u(y)$$

y explíquese por qué en este caso \hat{m}_{ml} es combinación lineal de \hat{m}_{1ml} y \hat{m}_{2ml} .

- iv) Obténganse \hat{a}_{ml} , \hat{a}_{1ml} y \hat{a}_{2ml} para el caso particular

$$p_X(x|a) = a \exp(-ax)u(x)$$

$$p_Y(y|a) = 2a \exp(-2ay)u(y)$$

3.Q13 Las vvaas s , x , se distribuyen conjuntamente según la ddp

$$p(s, x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(s + |x|), & 0 < s < 1, \quad -1 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Determínese $\hat{s}_{ms}(x)$.

En realidad, sólo resultan observables las muestras con $x > 0$; es decir, se trabaja con $p'(s, x) = p(s, x|x > 0)$.

- ii) Determínese $\hat{s}'_{ms}(x)$ (bajo p').
- iii) ¿Cuánto se degrada $\hat{s}'_{ms}(x)$ respecto a $\hat{s}_{ms}(x)$?

3.Q14 Considérese la va x con ddp

$$p(x) = \begin{cases} a \exp(x), & x < 0 \\ a \exp(-bx), & x > 0 \end{cases}$$

siendo $a, b > 0$, parámetros deterministas.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

3.Q15 El estimador $\hat{s}_C(\mathbf{x})$ se obtiene minimizando la media de un coste función del error de estimación, $C(\hat{s} - s)$. La media de s se incrementa un valor s_0 sin que se modifique ningún otro aspecto del modelo probabilístico; es decir, se pasa a una ddp conjunta $p'(s, \mathbf{x}) = p(s - s_0, \mathbf{x})$. Determinése el estimador óptimo para el mínimo coste y la nueva situación, $\hat{s}'_C(\mathbf{x})$, en función de $\hat{s}_C(\mathbf{x})$.

3.Q16 La va bidimensional x_1, x_2 , se rige por la ddp

$$p(x_1, x_2 | \alpha, m_1, m_2) = \frac{1}{4\alpha^2} \exp\left(-\frac{|x_1 - m_1| + |x_2 - m_2|}{\alpha}\right)$$

donde $\alpha > 0$, m_1, m_2 , son parámetros deterministas desconocidos. Para estimarlos, se toman K muestras $\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}$, independientemente unas de otras.

Determinése $\hat{m}_{1ml}\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}$, $\hat{m}_{2ml}\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}$, $\hat{\alpha}_{ml}\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}$.

3.Q17 Las componentes aleatorias superpuestas en la observación

$$x = s + n$$

están gobernadas por las ddps

$$p_S(s) = |a| p(as)$$

$$p_N(n) = |b| p(bn)$$

s y n son independientes.

- Establézcanse las expresiones de $\hat{s}_{ms}(x)$, $\hat{n}_{ms}(x)$.
- Verifíquese que dichas expresiones cumplen la evidente igualdad $\hat{s}_{ms}(x) + \hat{n}_{ms}(x) = x$.
¿Qué ocurre si $a = b$?

3.Q18 Considérese la ddp conjunta

$$p(s, x) = \begin{cases} \frac{sx + 2}{6 \ln 2 - 11/4}, & x, s > 1 \cap xs < 2 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- Determinése $\hat{s}_{ms}(x)$.
- Determinése $\hat{s}_{ma}(x)$.

3.E1 Considérese la observación

$$x = s + n$$

con la señal s inmersa en un ruido n independiente de ella, x siendo sus densidades de

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

3.E2 Se dispone de K muestras, tomadas independientemente, de una variable x laplaciana $L(m, v)$

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2v}} \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{v}}|x - m|\right)$$

Obtener el estimador ML conjunto de m, v .

3.E3 i) Establézcase el estimador ML de un parámetro determinista m observado en K muestras

$$\text{de ruido gaussiano correlacionado: } \mathbf{r} = \begin{bmatrix} r^{(1)} \\ \vdots \\ r^{(K)} \end{bmatrix} : G(\mathbf{0}, \mathbf{V}_r)$$

ii) Ídem si el ruido toma valores independientes.

iii) Ídem si además el ruido tiene muestras idénticamente distribuidas.

3.E4 Se toman independientemente K muestras $\{x^{(k)}\}$ de una distribución uniforme $U(a, b)$ de parámetros a, b desconocidos.

i) Determinéense los estimadores ML de los parámetros a, b .

ii) Discútase si se pueden obtener los estimadores ML de la media m y la varianza v de la distribución directamente a partir de los estimadores anteriores.

3.E5 Se toman K muestras independientes de la distribución exponencial bilateral que tiene ddp

$$p(x) = \frac{a}{2} \exp(-a|x - b|)$$

i) Determinéense los estimadores ML de los parámetros a, b .

ii) Determinéense los estimadores ML de la media y la varianza de la distribución.

iii) Compárense los estimadores ML de la media de las distribuciones gaussiana, uniforme, y exponencial.

3.E7 La v.a. señal s se ve perturbada por un ruido aditivo r independiente de s , dando lugar a la v.a. observable

$$x = s + r$$

El comportamiento de la señal y ruido viene descrito por las d.d.p.

$$p(s) = a \exp(-as)u(s)$$

$$p(r) = b \exp(-br)u(r)$$

$$a, b > 0 \quad a \neq b$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

e) A la vista de los resultados anteriores, indíquese cuando sería razonable emplear \hat{s}_{ML} .

3.E8 Se mide el parámetro determinista desconocido s , $s > 0$, mediante dos sistemas, que proporcionan las observaciones

$$x_i = a_i s + n_i, \quad i = 1, 2$$


siendo $\{a_i\}$, $\{n_i\}$, vv.aa. gaussianas e independientes entre sí, con medias $E\{a_i\} = 1, E\{n_i\} = 0$, y varianzas $\{v_{ai}\}, \{v_{ni}\}$, respectivamente ($i = 1, 2$).

- Establézcase la expresión que proporciona el estimador ML de s, \hat{s}_{ML} .
- Calcúlese \hat{s}_{ML} para el caso particular $v_{ai} = 0, i = 1, 2$.
- Calcúlese \hat{s}_{ML} para el caso particular $v_{ni} = 0, i = 1, 2$.


3.E9 La v.a. x con ddp

$$p(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

se transforma como indica en la figura, dando lugar a la v.a. observable y .



- Obtégase el estimador de máxima verosimilitud de r, \hat{r}_{ML} , a partir de K observaciones de y tomadas de forma independiente.
- Considérese la situación



y obtégase \hat{r}_{ML} de K observaciones de z tomadas independientemente. Coméntese el resultado.

3.E10 Para averiguar la ganancia de dos sensores iguales se mide con ellos un parámetro determinista c de valor conocido, proporcionando los sensores las salidas

$$x_1 = gc + n_1$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- b) Calcúlense la media y la varianza condicionadas a g de \hat{g}_{ml} .
 c) ¿Es \hat{g}_{ml} un estimador absolutamente eficiente?

3.E11 La señal aleatoria x , con ddp de tipo potencial

$$p_X(x) = \begin{cases} (a+1)x^a, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

es amplificada por un sistema con ganancia aleatoria g , también potencial e independiente de x

$$p_G(g) = \begin{cases} (b+1)g^b, & 0 < g < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

siendo $a > b + 1 > 1$.

- a) Determínese el estimador de error cuadrático medio mínimo de la señal de salida $y = gx$ a la vista de la entrada, $\hat{y}_{ms}(x)$.
 b) Determínese el estimador de error cuadrático medio mínimo de la entrada a la vista de la salida, $\hat{x}_{ms}(y)$.

3.E12 Las vv.aa. s y x obedecen a la ddp conjunta

$$p(s, x) = \frac{1}{2}(1 + sx)\exp[-(s + x)] u(s) u(x)$$

- i) Determínese $\hat{s}_{ms}(x)$ y $\hat{x}_{ms}(s)$.
 ii) Determínese $\hat{s}_{map}(x)$.
 iii) Determínese $\hat{s}_{ml}(x)$.
 iv) Establézcase la ecuación que permite determinar $\hat{s}_{abs}(x)$ mediante búsqueda.

3.E13 Las vvaas s , x , se distribuyen conjuntamente según la ddp

$$p(s, x) = \begin{cases} 60sx^2, & 0 < s < 1 - x, \quad 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Calcúlese $\hat{s}_{map}(x)$.
 ii) Calcúlese $\hat{s}_{ml}(x)$.
 iii) Calcúlese $\hat{s}_{ms}(x)$.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

- i) Determínese el estimador de error cuadrático medio mínimo de s a la vista de x , $\widehat{s}_{\text{ms}}(x)$.
- ii) Establézcase el estimador de error absoluto medio mínimo de s a la vista de x , $\widehat{s}_{\text{ab}}(x)$.

Considérese ahora que el dominio en que tiene validez la expresión de $p(s, x)$ es $0 \leq s \leq 2x \leq 2$.

- iii) Determínese el estimador de error cuadrático medio mínimo de s a la vista de x , $\widehat{s}'_{\text{ms}}(x)$.
- iv) Establézcase el estimador de error absoluto medio mínimo de s a la vista de x , $\widehat{s}'_{\text{ab}}(x)$.

Finalmente

- v) Discútanse las razones de las diferencias entre los estimadores \widehat{s} y los \widehat{s}' .

3.E15 Una señal aleatoria x que tiene ddp de Pareto

$$p_X(x) = \begin{cases} cd^c/x^{c+1}, & d < x < \infty \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

con parámetros $c > 0$ conocido y $d > 0$ determinista y desconocido, se ve afectada por un ruido multiplicativo aleatorio n independiente de x y de distribución potencial de orden 1

$$p_N(n) = \begin{cases} 2n, & 0 < n < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

dando lugar a la va observable $y = nx$.

Se toman K observaciones de y , $\{y^{(k)}\}$, independientemente unas de otras. Calcúlese el estimador ML del parámetro d , \widehat{d}_{ml} .

3.E16 La ddp conjunta de las vvaas s, x , es

$$p(s, x) = \begin{cases} s \exp(-|s - x|), & -\infty < x < \infty, \quad 0 < s < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Determínese $\widehat{s}_{\text{ms}}(x)$.
- ii) Establézcase $\widehat{s}_{\text{map}}(x)$.

3.E17 La ddp conjunta de las vvaas s, x , tiene la forma

$$p(s, x) = \begin{cases} 3s, & \left\{ \begin{array}{l} 0 < s < x \\ 0 < x < 1 \end{array} \right\} \cup \left\{ \begin{array}{l} 0 < s < 2 - x \\ 1 < x < 2 \end{array} \right\} \end{cases}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

3.E18 La ddp de la va x tiene la forma

$$p_X(x|m) = \frac{1}{m} \exp(-x/m)u(x), \quad m > 0$$

pero sus valores se obtienen con un aparato de medida descalibrado que proporciona

$$y = x + ax^2, \quad a > 0.$$

Se desea estimar por máxima verosimilitud el parámetro determinista m a partir de K medidas tomadas independientemente unas de otras, $\{y^{(k)}\}$.

- i) Establézcase la expresión de $\hat{m}_{MLa}(\{y^{(k)}\})$.
¿Sería posible obtenerla a partir de la expresión de $\hat{m}'_{ML}(\{x^{(k)}\})$?
- ii) ¿Qué ocurre si $a \rightarrow 0$?
- iii) ¿Qué ocurre si $a \rightarrow \infty$?

3.E19 Una ddp lognormal es la que tiene la forma

$$p_X(x|a, b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi b}} \frac{1}{x} \exp\left\{-\frac{[\ln(x/a)]^2}{2b}\right\} u(x)$$

($a > 0$).

- i) Determínense los estimadores ML de los parámetros a, b , a partir de K observaciones de la va x , $\{x^{(k)}\}_{k=1}^K$, tomadas independientemente unas de otras.
- ii) Compruébese que la va x se obtiene de la normal $p_Y(y|m, v) = G(y|m, v)$ mediante la transformación $y = \ln(x)$, estableciendo la relación entre los parámetros a, b , y los m, v . ¿Es posible evaluar $\hat{m}_{ml}, \hat{v}_{ml}$, a partir de $\hat{a}_{ml}, \hat{b}_{ml}$?
- ii) Supóngase que $b = 1$, e indíquese por μ la media de la correspondiente lognormal. Determínese $\hat{\mu}_{ml}$ en función de $\{x^{(k)}\}_{k=1}^K$.

3.E20 Las vvaas s, x , siguen la ddp conjunta

$$p(s, x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \exp(-|s-x|), & 0 < x < 1, \quad -\infty < s < \infty \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Establézcase $\hat{s}_{ms}(x)$.
- ii) Calcúlese el error cuadrático medio $E\left\{\left(s - \hat{s}_{ms}(x)\right)^2\right\}$.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

3.E21 La ddp conjunta de las vvaas s, x , tiene la expresión

$$p(s, x) = \begin{cases} \frac{1}{a}(1 + s), & 0 < x < a|s|, \quad |s| < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

(obviamente, $a > 0$).

Determinense:

- i) $\hat{s}_{ms}(x)$
- ii) $\hat{s}_{ma}(x)$
- iii) $\hat{s}_{map}(x)$

3.E22 Las vvaas s, x , se distribuyen conjuntamente según

$$p_{S,X}(s, x) = \frac{1}{2}(s + x) \exp[-(s + x)] u(s)u(x)$$

- i) Determinése $\hat{s}_{ms}(x)$.

En la práctica, x se ve interferida aditivamente por la va r , independiente de s, x , con ddp

$$p_R(r) = \exp(-r)u(r)$$

de modo que se observa $x' = x + r$.

- ii) Determinése $\hat{s}_{ms}(x')$.

3.A1 El empleo de la estimación ML, y en particular de la media muestral, es coherente con la visión “frecuentista”, o clásica, de la probabilidad.

En efecto: la aparición de un suceso A puede asociarse con la v.a. “indicadora”

$$x_A = \begin{cases} 1, & \text{si se da } A \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

y la secuencia $\{x_A^{(k)}\}$ que se observa en K sucesos independientes tiene una probabilidad que depende de la del suceso A , P (desconocida).

- a) Estímese P vía ML.
- b) ¿A qué característica estadística de x_a corresponde P ?, ¿Y a qué estimador de ésta corresponde el obtenido para P ?

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

a) Considérese la función densidad de probabilidad $B(p, q)$

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}}{B_I(p, q)}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (p, q > 0)$$

donde $B_I(p, q)$ es la función β integral

$$B_I(p, q) = \int_0^1 y^{p-1}(1-y)^{q-1} dy$$

Compruébese que la estimación ML de p y q a partir de la observación de K muestras $\{x^{(k)}\}$ tomadas independientemente, conduce a ecuaciones acopladas de solución no inmediata.

b) Previo cálculo de la media y la varianza de $p(x)$, determínense los estimadores \hat{p}_{mt} y \hat{q}_{mt} utilizando el método de los momentos (sobre \bar{x} y \bar{v}).

(Recuérdese: $B_I(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B_I(p, q)$)

3.A3 Sea \hat{s} un estimador de punto estadísticamente creciente de un parámetro determinista s ; es decir, si $s_2 > s_1$ son dos valores de s , se verifica que $\Pr\{(\hat{s} > \hat{s}_1)|s_2\} > \Pr\{(\hat{s} > \hat{s}_1)|s_1\}$, donde \hat{s}_1 es cualquier valor de \hat{s} .

El estimador de intervalo (del parámetro determinista s) asociado a dicho estimador de punto es el par ordenado de valores $\{s_a, s_b\}$ correspondientes a un valor estimado \hat{s}_0 (que se obtendría a partir de una observación \underline{x}_0) que minimiza $s_b - s_a$, anchura del intervalo $[s_a, s_b]$, cumpliendo la condición

$$\Pr\{(\hat{s} < \hat{s}_0)|s_a \cap (\hat{s} > \hat{s}_0)|s_b\} = 1 - \delta$$

siendo δ ($\delta \ll 1$) el nivel de confianza ($1-\delta$, el coeficiente de confianza) del estimador de intervalo; nivel que se preselecciona para realizar los cálculos.

a) Compruébese que la condición citada equivale a

$$\Pr\{(\hat{s} > \hat{s}_0)|s_a\} + \Pr\{(\hat{s} < \hat{s}_0)|s_b\} = \delta$$

b) Suponiendo que $\Pr\{(\hat{s} > \hat{s}_0)|s_a\} = \delta_1$ ($\delta_1 < \delta$), compruébese que para $s_1 < s_a$ se verifica $\Pr\{(\hat{s} > \hat{s}_0)|s_1\} < \delta_1$; de modo que resulta muy improbable que si el parámetro s toma el valor s_1 se obtenga el valor \hat{s}_0 para el estimador de punto. Análogamente ocurre para $s_2 > s_b$.

c) En la práctica, y salvo que conduzca a resultados que vulneren claramente la minimización de la anchura del intervalo de confianza, se acepta el resultado de aplicar separadamente

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

donde $E\{\hat{s}|s\}$ y $V\{\hat{s}|s\}$ son la media y la varianza de \hat{s} dado s , respectivamente (que se suponen no relacionadas entre sí), que se admiten conocidas, y la utilización de los percentiles¹ de z . Verifíquese que las ecuaciones implícitas para determinar s_a y s_b son

$$\hat{s}_0 = E\{\hat{s}|s_a\} + \sqrt{V\{\hat{s}|s_a\}}z_{1-\delta/2}$$

$$\hat{s}_0 = E\{\hat{s}|s_b\} + \sqrt{V\{\hat{s}|s_b\}}z_{\delta/2}$$

- d) Determínese el estimador de intervalo $\{m_a, m_b\}$ con nivel de confianza δ (dado) de la media m de una v.a. x de varianza conocida v (no relacionada con m) asociado a la media muestral \bar{x} calculada a partir de K observaciones de $x, \{x^{(k)}\}_{k=1}^K$, tomadas independientemente, siendo K suficientemente alto como para considerar que \bar{x} tiene un comportamiento gaussiano.

3.A4 Se puede definir el estimador de intervalo de una v.a. s dada una observación \mathbf{x} como el par ordenado de valores $\{s_a(\mathbf{x}), s_b(\mathbf{x})\}$ que minimiza $s_b - s_a$ (anchura del intervalo de confianza, $[s_a, s_b]$) cumpliendo:

$$\Pr\{s_a < s < s_b | \mathbf{x}\} = 1 - \delta$$

donde δ ($\delta \ll 1$) es el nivel de confianza del estimador; $1 - \delta$ se denomina coeficiente de confianza.

Considése la situación descrita por:

$$x = s + n$$

siendo:

$$s : G_{\{m, v_s\}}(s)$$

$$n : G_{\{0, v_n\}}(n)$$

e independientes entre sí.

- a) Determínese el estimador de intervalo de nivel de confianza δ de s , expresado en función del percentil $100(1-\delta/2)$ de la v.a. $z : G_{\{0,1\}}(z)$; es decir, el valor $z_{1-\delta/2}$ que verifica

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z_{1-\delta/2}} \exp(-z^2/2) dz = 1 - \delta/2$$

- b) ¿Qué ocurre si $v_n \gg v_s$?
 c) ¿Qué ocurre si $v_s \gg v_n$?

3.A5 La condición que proporciona el estimador óptimo de una va s a la vista de las vvaas \mathbf{x} bajo un coste $C(s, \hat{s})$

$$\hat{s}(\mathbf{x}) = \arg \min_{\hat{s}} \bar{C}(\hat{s} | \mathbf{x}) = \arg \min_{\hat{s}} \int C(s, \hat{s}) p(\mathbf{x} | s) ds$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Cartagena99

no puede aplicarse directamente si se restringe la forma de \hat{s} a una familia de funciones indexada por \mathbf{w} , $\hat{f}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x})$, porque la versión

$$\hat{f}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) \stackrel{?}{=} \arg \min_{\mathbf{w}} \bar{C}(f_{\mathbf{w}}|\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{w}} \int C(s, f_{\mathbf{w}}) p(s|\mathbf{x}) ds$$

en general, no tiene solución.

- i) Verifíquese que así ocurre si $C(s, f_{\mathbf{w}}) = (s - f_{\mathbf{w}})^2$, $p(s|x) = x \exp(-xs) u(s) u(x)$ y $f_{\mathbf{w}} = w_0 + w_1 e^x$.
- ii) Indíquese cuál es el procedimiento general para obtener $\hat{f}_{\mathbf{w}}(\mathbf{x})$.
- iii) Procédase a determinar $\hat{f}_{\mathbf{w}}(x)$ para el caso del apartado i) si

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- iv) Discútase qué ocurre procediendo como en i) si se consideran estimadores de la forma $g_{\mathbf{w}}(x) = w_0 + w_1/x$.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tema 4: “Los casos generales gaussianos”

4.D1 Demuéstrase que la solución de error cuadrático medio mínimo al problema de deconvolución

$$\mathbf{x} = \mathbf{H}\mathbf{s} + \mathbf{n}$$

con la señal \mathbf{s} ($N_1 \times 1$) y ruido \mathbf{n} ($N_2 \times 1$) correlacionados según

$$p\left(\begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{n} \end{bmatrix}\right) = G\left(\begin{bmatrix} s \\ n \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} \mathbf{m}_s \\ \mathbf{m}_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{ss} & \mathbf{V}_{sn} \\ \mathbf{V}_{ns} & \mathbf{V}_{nn} \end{bmatrix}\right)$$

(\mathbf{H} es una matriz $N_2 \times N_1$) tiene como expresión

$$\hat{\mathbf{s}}_{ms}(\mathbf{x}) = \mathbf{W}^T \mathbf{x} + \mathbf{w}_0$$

con

$$\mathbf{W}^T = (\mathbf{V}_{ss} \mathbf{H}^T + \mathbf{V}_{sn})(\mathbf{H} \mathbf{V}_{ss} \mathbf{H}^T + \mathbf{H} \mathbf{V}_{sn} + \mathbf{V}_{ns} \mathbf{H}^T + \mathbf{V}_{nn})^{-1}$$

$$\mathbf{w}_0 = \mathbf{m}_s - \mathbf{W}^T (\mathbf{H} \mathbf{m}_s + \mathbf{m}_n)$$

4.Q1 A partir de las variables aleatorias unidimensionales s y r , con densidad de probabilidad conjunta

$$p(s, r) = G\left(\begin{bmatrix} s \\ r \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}\right)$$

se forma la observación $x = s + r$

- a) Determinése $\hat{\mathbf{s}}_{ms}$.
- b) ¿Era previsible el resultado? (Considérese la relación que existe entre $E\{r|x\}$ y $E\{s|x\}$).

4.Q2 En un problema de decisión binaria las observaciones N -dimensionales \mathbf{x} se obtienen a partir de las señales M -dimensionales $\{\mathbf{s}_i\}$, $i = 0, 1$, en la forma

$$H_0 : \mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{s}_0 + \mathbf{n}$$

$$H_1 : \mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{s}_1 + \mathbf{n}$$

siendo \mathbf{A} una matriz $N \times M$ conocida, \mathbf{n} un ruido $G(\mathbf{n}|\mathbf{0}, \mathbf{V})$, $\mathbf{s}_1 = \mathbf{1}$ y $\mathbf{s}_0 = -\mathbf{1}$. Nótese que $\mathbf{A}\mathbf{s}_1 = \mathbf{m}_1$, vector determinista que se supone conocido. Las hipótesis son equiprobables y se aplica la política de minimizar la probabilidad de error.

- a) Determinése el decisor óptimo.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

4.Q3 La va observada en un problema de decisión binaria tiene la forma

$$H_0 : x = s_a + s_b + n$$

$$H_1 : x = s_a - s_b + n$$

siendo s_a , s_b , n , vva gaussianas independientes de medias m_a , m_b , 0, y varianzas v_a , v_b , v , respectivamente. Las probabilidades de ambas hipótesis son $Pr(H_0) = 10/11$ y $Pr(H_1) = 1/11$.

- Diséñese el decisor MAP.
- Discútase en términos cualitativos qué ocurre si $s_a = 0$.
- Discútase en términos cualitativos qué ocurre si $s_b = 0$.
- Discútase en términos cualitativos qué ocurre si $m_a = 0$.
- Discútase en términos cualitativos qué ocurre si $m_b = 0$.

4.Q4 La ddp conjunta de las variables x_1 , x_2 , tiene la forma

$$p(x_1, x_2 | \mathbf{m}, V) = G(x_1 | m_1 + m_2, v_1) G(x_2 | m_2, v_2)$$

- Supóngase que m_1 , m_2 , son parámetros deterministas desconocidos, y que v_1 , v_2 , son valores conocidos. Determinense los estimadores \hat{m}_{1ml} , \hat{m}_{2ml} , a partir del conjunto de observaciones tomadas independientemente $\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}_{k=1}^K$.
- Supóngase que, además de conocerse v_1 , v_2 , se conoce el valor de m_2 . Demuéstrese que, en estas condiciones, x_2 es un estadístico irrelevante para obtener el estimador de máxima verosimilitud de m_1 , \tilde{m}_{1ml} , y determínese dicho estimador.

4.Q5 En un problema de decisión binaria gaussiano bidimensional las verosimilitudes tienen las formas

$$p(\mathbf{x} | H_1) = G\left(\mathbf{x} \mid \mathbf{0}, \begin{bmatrix} v_a & 0 \\ 0 & v_b \end{bmatrix}\right)$$

$$p(\mathbf{x} | H_0) = G\left(\mathbf{x} \mid \mathbf{0}, \begin{bmatrix} v_b & 0 \\ 0 & v_a \end{bmatrix}\right)$$

siendo $v_a > v_b$.

Determínese el decisor ML óptimo, y represéntense las regiones de decisión en el plano x_1 , x_2 .

4.Q6 Considérese la ddp gaussiana

$$p_1(s, x) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{s^2 + x^2}{2\sigma^2}\right)$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

cuyo perfil es gaussiano, pero el soporte es el primer cuadrante del círculo unidad.

- ii) Determinése $\hat{s}_{2ms}(x)$.
- iii) Discútase a qué se debe la diferencia cualitativa entre $\hat{s}_{1ms}(x)$ y $\hat{s}_{2ms}(x)$.

4.Q7 Un problema tetradimensional de decisión binaria e hipótesis equiprobables está caracterizado por las verosimilitudes gaussianas:

$$p(\mathbf{x}|H_1) = G\left(\mathbf{x} \left| \begin{matrix} +1 \\ -1 \\ +1 \\ -1 \end{matrix} \right., \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right)$$

$$p(\mathbf{x}|H_0) = G\left(\mathbf{x} \left| \begin{matrix} -1 \\ +1 \\ -1 \\ +1 \end{matrix} \right., \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right)$$

Una decisión correcta no apareaja coste alguno, y los costes de ambos tipos de errores son iguales.

- i) Determinése el test óptimo.
- ii) Calcúlese la probabilidad de error.

4.Q8 Considérese el problema gaussiano de decisión binaria bajo criterio MAP definido por las verosimilitudes

$$p(\mathbf{x}|H_0) = G(\mathbf{x}|\mathbf{0}, V)$$

$$p(\mathbf{x}|H_1) = G(\mathbf{x}|\mathbf{m}, V)$$

y la probabilidad a priori $\Pr(H_0)$.

Como se sabe, la frontera de decisión viene dada por un hiperplano. Determinése los márgenes de valores de $\Pr(H_0)$ para los que dicha frontera

- i) pasa entre los puntos $\mathbf{0}$ y \mathbf{m} ;
- ii) deja dichos puntos en cada una de las regiones de decisión.

4.Q9 En un problema bidimensional binario de decisión gaussiana las verosimilitudes de las hipótesis son

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- ii) En la práctica, se trabaja con datos contaminados $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{n}$, siendo \mathbf{n} un ruido gaussiano independiente de \mathbf{x} de vector de medias nulo y matriz de covarianza $V_n = \begin{bmatrix} v_1 & 0 \\ 0 & v_2 \end{bmatrix}$. El diseñador lo sabe y aplica el correspondiente decisor óptimo. Determinése dicho decisor y sus prestaciones P'_{FA} , P'_M y P'_e .
- iii) Discútase la degradación de prestaciones que provoca la presencia del ruido \mathbf{n} .

4.Q10 Un problema bidimensional de decisión binaria presenta verosimilitudes gaussianas de medias nulas y matrices de covarianza

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{bmatrix}, \text{ bajo la hipótesis } H_1$$

$$V_0 = \begin{bmatrix} 1 - \rho^2 & 0 \\ 0 & 1 - \rho^2 \end{bmatrix}, \text{ bajo la hipótesis } H_0$$

$$0 < \rho < 1.$$

Las hipótesis son equiprobables y se aplica el criterio MAP. Determinése y representense las regiones de decisión.

4.Q11 Considérese un problema N-dimensional de test de 3 hipótesis que responden a las verosimilitudes gaussianas circulares

$$p(\mathbf{x}|H_i) = G(\mathbf{x}|\mathbf{0}, v_i\mathbf{I}), \quad i = 1, 2, 3$$

siendo $v_3 > v_2 > v_1$.

Establézcase el test de umbrales para situación ML.

4.Q12 Dos hipótesis equiprobables se manifiestan en un espacio bidimensional $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$ según las verosimilitudes

$$p(\mathbf{x}|H_0) = \frac{1}{2\pi [\det(V_0)]^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T V_0^{-1} \mathbf{x}\right)$$

$$p(\mathbf{x}|H_1) = \frac{1}{2\pi [\det(aV_0)]^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T (aV_0)^{-1} \mathbf{x}\right]$$

$$(a > 0), \text{ con } V_0 = D_0 = \begin{bmatrix} d_0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Discútase la forma de la frontera MAP según los valores de d_0 .

4.Q13 Un problema de test de hipótesis ternario y bidimensional presenta las verosimilitudes

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- ii) Calcúlese dicha probabilidad de error.
- iii) El escenario cambia, apareciendo una cuarta hipótesis con verosimilitud

$$p(\mathbf{x}|H_4) = \frac{1}{2\pi^4} \exp\left(-\frac{x_1^2 + x_2^2}{8}\right)$$

y volviendo a ser las cuatro hipótesis equiprobables. ¿Cómo se modifican los resultados del apartado i)?

- iv) ¿Cómo se modifican los resultados del apartado ii) en el escenario de iii)?

(Nota: en un cambio a polares, $x_1 = \rho \cos \theta, x_2 = \rho \sin \theta, dx_1 dx_2 = \rho d\rho d\theta$)

4.Q14 En un problema bidimensional gaussiano de decisión binaria con hipótesis equiprobables las verosimilitudes son:

$$p(x_1, x_2|H_1) = G\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ a \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v_1 & 0 \\ 0 & v_2 \end{bmatrix}\right)$$

$$p(x_1, x_2|H_0) = G\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} bv_1 & 0 \\ 0 & v_2 \end{bmatrix}\right)$$

con $a \geq 0, b \geq 1$. El criterio a emplear es el MAP.

Determinense las formas de las regiones de decisión según los valores de a, b .

4.Q15 Las vvaas s, x , son conjuntamente gaussianas, con vector de medias

$$\begin{bmatrix} m_s \\ m_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y matriz de covarianzas

$$\begin{bmatrix} v_{ss} & v_{sx} \\ v_{xs} & v_{xx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- i) Determinese el estimador de error cuadrático medio mínimo de s a la vista de $x, \hat{s}_{ms}(x)$, y calcúlese dicho error cuadrático.
- ii) La variable observada interfiere con la variable a estimar en la forma

$$s' = s + ax$$

Determinese el nuevo estimador de error cuadrático medio mínimo $\hat{s}'_{ms}(x)$, y calcúlese su error cuadrático medio.

- iii) ¿Cuánto se incrementaría el error cuadrático medio si se estimase s' mediante $\hat{s}'_{ms}(x)$?



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- i) Establézcase el decisor ML.
- ii) Calcúlense P_{FA} y P_M .

4.Q17 Las hipótesis equiprobables H_0 y H_1 se manifiestan en un espacio tridimensional de observaciones según las verosimilitudes

$$p(\mathbf{x}|H_0) = G\left(\mathbf{x} \mid \mathbf{0}, \begin{bmatrix} v_1 & 0 & 0 \\ 0 & v_2 & 0 \\ 0 & 0 & v_3 \end{bmatrix}\right)$$

$$p(\mathbf{x}|H_1) = G\left(\mathbf{x} \mid \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v_1 & 0 & 0 \\ 0 & v_2 & 0 \\ 0 & 0 & v_3 \end{bmatrix}\right)$$

Para implementar el decisor, se dispone de un sistema que sólo puede registrar dos variables. Establézcase la regla para seleccionarlas de modo que se obtenga la menor probabilidad de error.

4.E1 Considere el problema de decisión binaria sobre la variable tetradsimensional $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$

$$H_0 : \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ es } G\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

x_4 es $U[0, \sqrt{v}]$ (uniforme entre 0 y \sqrt{v}) e independiente de las anteriores

$$H_1 : \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ es } G\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & v \end{bmatrix}\right)$$

x_4 es $U[0, 1]$ e independiente de las anteriores.

Suponiendo $v > 1$:

- a) Establezca el decisor ML.
- b) Calcule P_{FA} y P_M .

4.E2 Considérese el problema bidimensional binario Gaussiano:

$$H_0 : \mathbf{x} \text{ es } G\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$H_1 : \mathbf{x} \text{ es } G\left(\begin{bmatrix} 0 \\ v \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

4.E3 Las verosimilitudes

$$p(\mathbf{x}|H_0) = G(\mathbf{x}|\mathbf{0}, v\mathbf{I})$$

$$p(\mathbf{x}|H_1) = G(\mathbf{x}|\mathbf{m}, v\mathbf{I})$$

donde $\mathbf{0}$ y \mathbf{m} son vectores N -dimensionales de componentes 0 y $\{m_n\}$, respectivamente, e \mathbf{I} la matriz unitaria $N \times N$, corresponden a las observaciones \mathbf{x} (N -dimensionales) en un problema de decisión binaria (gaussiano).

- Diséñese el decisor ML.
- ¿Cuánto y en qué sentido habría que trasladar el umbral del decisor anterior si $Pr(H_0) = 1/4$ y se desease diseñar un decisor de mínima probabilidad de error?
- Calcúlense P_{FA} y P_M para el decisor ML. ¿Qué ocurre si crece el número de dimensiones y $\{m_n\} \neq 0$?
- Si en la práctica se tiene acceso a

$$z = \mathbf{m}^T \mathbf{x} + n$$

donde n es $G(n|m', v_n)$ e independiente de \mathbf{x} , en lugar de a las observaciones \mathbf{x} , ¿cómo ha de modificarse el diseño del decisor ML?

- Calcúlense P'_{FA} y P'_M para el diseño del apartado d). ¿Cómo varían respecto a P_{FA} y P_M ?

Nota: Utilícese, cuando convenga, la función de error complementario dada por la expresión:

$$\text{erfc}(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\infty} \exp(-t^2/2) dt$$

4.E4 En un problema de decisión binaria tridimensional de hipótesis equiprobables, se supone que las verosimilitudes son

$$p(\mathbf{x}|H_1) = G(\mathbf{x}|\mathbf{0}, v_1\mathbf{I})$$

$$p(\mathbf{x}|H_0) = G(\mathbf{x}|\mathbf{0}, v_0\mathbf{I})$$

donde I es la matriz unitaria 3×3 . La política de costes establecida impone $C_{01} = 9C_{10}$ y $C_{00} = C_{11} = 0$. Además, $v_1 = 9v_0$.

- Diséñese el decisor de coste medio mínimo bajo las condiciones anteriores.
- En realidad, $p(\mathbf{x}|H_1)$ y $p(\mathbf{x}|H_0)$ son ddps uniformes sobre soportes cúbicos centrados en el origen y varianzas $v_1\mathbf{I}$ y $v_0\mathbf{I}$, respectivamente. Diséñese el correspondiente decisor óptimo bajo la misma política de costes anterior.
- Calcúlense las probabilidades de falsa alarma y de pérdida para los dos diseños anteriores (P_{FA} , P_M y P_{FA} , P_M respectivamente) en la situación real, así como las

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- ii) Calcúlese la probabilidad de error asociada a dicho decisor.
- iii) Considérese un problema análogo en D dimensiones. ¿Cuál sería la probabilidad de error?, ¿cómo evoluciona dicha probabilidad con $D \rightarrow \infty$?

4.E6 Las verosimilitudes de un problema bidimensional de decisión binaria siguen las formas conoidales

$$p(x, y|H_1) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \{1 - [(x-1)^2 + (y-1)^2]\}, & (x-1)^2 + (y-1)^2 < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$p(x, y|H_0) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} [1 - (x^2 + y^2)], & x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

El problema se plantea como decisión ML.

- i) Determínese el decisor ML.
- ii) Calcúlese P_{FA} , P_M y P_e .
- iii) ¿Cómo cambia la frontera de decisión si las verosimilitudes pasan a ser gaussianas con las mismas medias anteriores y matrices de covarianza iguales y diagonales, vI ?
- iv) Calcúlese P'_{FA} , P'_M y P'_e para el caso del apartado iii), utilizando la función complementaria de error de Van Trees, $\text{erfc}(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_u^\infty \exp(-t^2/2) dt$.
- v) ¿Cómo cambia la frontera de decisión si las verosimilitudes pasan a ser piramidales cuadradas, $p''(x, y|H_0)$ con los vértices de la base en $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ y $(0, -1)$, y $p''(x, y|H_1)$ de igual forma pero con su centro trasladado a $(1, 1)$?
- vi) Calcúlese P''_{FA} , P''_M y P''_e para el caso del apartado v).

4.E7 Una va con distribución gaussiana de media 0 y varianza v se ve interferida aditivamente por un ruido impulsivo de valor m ó $-m$ ($m > 0$), que aparece con probabilidad λ , siendo $\lambda < 1/3$, en cada una de sus formas (positiva y negativa).

Se observa la señal resultante x , y se desea elegir una de las tres alternativas posibles: no se ha producido interferencia, ha aparecido una interferencia positiva, o se ha dado una interferencia negativa.

- i) Diseñese el decisor de mínima probabilidad de error.
- ii) Calcúlese las probabilidades de falsas detecciones y de pérdida de cada una de las dos formas de interferencias.

(Hay dos tipos de falsa detección: detección en ausencia y detección con signo equivocado).

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- i) Determínese $\hat{s}_{ms}(\mathbf{x})$ y calcúlese $E\{(s - \hat{s}_{ms}(\mathbf{x}))^2\}$.
- ii) Un analista realiza el diseño utilizando erróneamente $c/2$ en lugar de c . Determínese su diseño $\hat{s}_{ms(c)}(\mathbf{x})$ y calcúlese el exceso de error cuadrático medio, Δ_c , que implica su uso respecto al de $\hat{s}_{ms}(\mathbf{x})$.
- iii) Otro diseño erróneo supone que $v_{sx_4} = d \neq 0$. Determínese su expresión, $\hat{s}_{ms(d)}(\mathbf{x})$, y calcúlese el exceso de error cuadrático medio, Δ_d , que aparece su empleo.

4.E9 Considérese el problema gaussiano de decisión binaria caracterizado por las verosimilitudes

$$p(\mathbf{x}|H_1) = G(\mathbf{x}|\mathbf{m}, vI)$$

$$p(\mathbf{x}|H_0) = G(\mathbf{x} | - \mathbf{m}, vI)$$

y de hipótesis equiprobables. $\mathbf{m} = [m_1 \dots m_N]^T$

- i) Establézcase el decisor de mínima probabilidad de error.
- ii) Calcúlense P_{FA} , P_M y P_e para dicho decisor.
- iii) Un adversario tiene la posibilidad de interferir una de las variables observadas, digamos la x_n , con un ruido gaussiano (independiente de \mathbf{x}) de media nula y varianza v_r . ¿Cómo debe elegir n ?
- iv) Calcúlense P'_{FA} , P'_M y P'_e para el decisor que se ha establecido en i) bajo la interferencia más dañina.
- v) Si se conoce completamente la estrategia del adversario (incluido el valor de v_r), ¿existe alguna contramedida que permita recuperar P_{FA} , P_M y P_e ?

$$\left(\int_u^\infty G(t|0, 1) dt = \text{erfc}(u) \right)$$

4.A1 Extender las formulas de la estimación en el caso general gaussiano y sus situaciones particulares cuando señal \mathbf{s} y ruido \mathbf{r} tienen medias no nulas: \mathbf{m}_s y \mathbf{m}_r , respectivamente. (Sugerencia: retírense las medias de las variables).

Interprétese el resultado para el caso de observaciones independientes de la misma variable en ruido i.i.d. en función de la presencia de \mathbf{m}_s y la media muestral corregida (según la media del ruido, \mathbf{m}_r).

4.A2 i) Demuéstrese por inducción que la suma de los cuadrados de N vv.aa. gaussianas $\{x_n\}$ independientes entre sí, de medias nulas y varianzas v (por tanto, equidistribuidas)

$$z = \sum^N x_n^2$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

$$\Gamma(r) = \int_0^{\infty} t^{r-1} \exp(-t) dt$$

que verifica $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Téngase en cuenta que la función beta integral

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$$

está relacionada con la gamma según

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

- ii) Considérese el problema de decisión binaria tetradimensional gaussiano de hipótesis equiprobables y verosimilitudes

$$p(\mathbf{x}|H_1) = G(\mathbf{x}|\mathbf{0}, v_1\mathbf{I})$$

$$p(\mathbf{x}|H_0) = G(\mathbf{x}|\mathbf{0}, v_0\mathbf{I})$$

($v_1 > v_0$). Determinése el decisor MAP y calcúlense las P_{FA} y P_M .



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tema 6: “Estimación y regresión lineales”

6.Q1 Las señales s_1 y s_2 se observan en la forma

$$x_1 = s_1 + s_2 + n_1$$

$$x_2 = s_1 - s_2 + n_2$$

siendo n_1, n_2 , ruidos de media 0 e incorrelacionados con ellas y entre sí, de varianzas iguales v_{nn} . Las señales s_1 y s_2 también tienen media nula y están incorrelacionadas entre sí, siendo sus varianzas v_{11} y v_{22} , respectivamente.

a) Determinése el estimador lineal de error cuadrático medio mínimo de

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix}, \text{ indicándolo como } \hat{\mathbf{s}}(x) = \begin{bmatrix} \hat{s}_1(\mathbf{x}) \\ \hat{s}_2(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

b) Discútase el comportamiento del estimador anterior en situaciones de ruido débil ($v_{nn} \ll v_{11}, v_{22}$) e intenso ($v_{nn} \gg v_{11}, v_{22}$).

6.Q2 La matriz de covarianzas de las v.v.aa. de medias nulas s y x tiene la forma

$$\begin{bmatrix} v_{ss} & v_{sx} \\ v_{xs} & v_{xx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & c \\ c & v_2 \end{bmatrix}$$

a) Determinése el estimador lineal de mínimo error cuadrático medio, $\hat{s}_{lms}(x)$, y el valor cuadrático medio del error $\hat{e}_{lms}(x) = s - \hat{s}_{lms}(x)$.

b) No se tiene acceso a la v.a. x , pero sí a $y = x + n$, siendo n un ruido aleatorio incorrelacionado con s y x , de media 0 y varianza v_2 .

Determinése $\hat{s}_{lms}(y)$ y el valor cuadrático medio del error $\hat{e}_{lms}(y) = s - \hat{s}_{lms}(y)$.

c) No se tiene acceso directo a x , pero sí a su versión amplificada $z = 2x$.

Determinése $\hat{s}_{lms}(z)$ y el valor cuadrático medio del error $\hat{e}_{lms}(z) = s - \hat{s}_{lms}(z)$.

d) Explíquese la diferencia entre los resultados de los apartados b) y c).

6.Q3 El vector aleatorio $\mathbf{z} = [s \ x_1 \ x_2]^T$ tiene vector de medias

$$\mathbf{m}_{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y matriz de correlaciones

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



6.Q4 La variable aleatoria $z = [s \ x_1 \ x_2 \ x_3]^T$ tiene media nula y matriz de covarianzas

$$V_{zz} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0.5 & 0 \\ 1 & 0.5 & 1 & 0.1 \\ 1 & 0 & 0.1 & 1 \end{bmatrix}$$

Se desea construir estimadores lineales de s a partir de las demás componentes, con error cuadrático medio mínimo.

- Por motivos prácticos, sólo se puede hacer uso de una de las variables observadas. ¿Cuál ha de seleccionarse y por qué?
- ¿Cuál es la expresión del estimador $\hat{s}_{lms}(x_i)$ para la situación descrita en a)?
- Calcúlese el error cuadrático medio que proporciona el estimador que se acaba de calcular.
- La situación permite utilizar dos de las tres variables observadas. ¿Cuáles han de seleccionarse, y por qué?
- ¿Cuál es la expresión del estimador $\hat{s}_{lms}(x_i, x_j)$ para esta segunda situación?
- Calcúlese el error cuadrático medio que se obtiene al aplicar este segundo estimador. Coméntese el resultado.

6.Q5 Las vvaas $s, \{x_i\}_{i=1}^3$, tienen medias nulas. La varianza de s es $v_{ss} = 2$, las covarianzas v_{sx_i} son todas unitarias, y la matriz de covarianzas de las $\{x_i\}$ vale

$$V_{xx} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Determinése el estimador lineal de error cuadrático medio mínimo de s a la vista de las $\{x_i\}$, $\hat{s}_{lms}(x_1, x_2, x_3)$, y calcúlese el valor de su error cuadrático medio.
- Si no se tiene acceso a x_2 y x_3 por separado, sino a la combinación lineal $x'_2 = x_2 - x_3$, ¿como será el estimador lineal de error cuadrático medio mínimo de s dados x_1 y x'_2 , $\hat{s}_{lms}(x_1, x'_2)$? Calcúlese el valor de dicho error cuadrático medio.

Nota

Recuérdese que la inversa de una matriz A es

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} C_A^T$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

6.Q6 Se dispone de la siguiente tabla de valores observados de la variable s en función de la variable determinista x :

	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$
$x^{(k)}$	-2	-1	0	1	2
$s^{(k)}$	1.8	0.4	0.2	0.6	2.1

- Un analista admite para s un modelo de regresión lineal. Determínese el estimador resultante, $\hat{s}(x) = \hat{w}_0 + \hat{w}_1 x$, y tabúlense los errores para los valores observados de x , $\hat{e}(x^{(k)}) = s^{(k)} - \hat{s}(x^{(k)})$.
- Visualizando las observaciones en el plano x, s , un segundo analista propone para s el modelo de tipo parabólico $s_2(x) = w'_0 + w'_1 x^2 + n'$. Determínese el correspondiente estimador $\hat{s}_2(x) = \hat{w}'_0 + \hat{w}'_1 x^2$. Tabúlense los errores $\hat{e}_2(x^{(k)}) = s^{(k)} - \hat{s}_2(x^{(k)})$ y compárense con los obtenidos en el apartado anterior.

6.Q7 Las vva. incorrelacionadas entre sí x_1, x_2 , tienen media y varianzas iguales, m_x y v_{xx} . Se desea utilizarlas para estimar linealmente con error cuadrático medio mínimo (lms) la v.a. s , que tiene media nula. La covarianza de cualquiera de las x_i con s es v_{xs} .

Se dispone de dos sistemas para implementar estimadores lms. El primero puede registrar una sola variable, pero libre de ruido, y calcula $\hat{s}_{lms}(x_i)$. El segundo es capaz de registrar las dos, pero introduciendo sobre ellas ruidos aditivos n_1, n_2 , de medias nulas, varianzas iguales v_{nn} , e incorrelacionados entre sí y con todas las demás variables; calculando $\tilde{s}_{lms}(y_1, y_2) = \tilde{s}_{lms}(x_1 + n_1, x_2 + n_2)$.

- Establézcanse las expresiones de $\hat{s}_{lms}(x_i)$ y $\tilde{s}_{lms}(y_1, y_2)$.
- Indíquese qué condición determina cuál de ambas opciones es mejor.

6.Q8 Las vv.aa. s, x_1, x_2, x_3 , tienen medias nulas y covarianzas dadas por

$$v_{ss} = 4$$

$$\underline{v}_{xs}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$v_{xx} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Se construye $\hat{s}_{lms}(x_1) = w_0 + w_1 x_1$, y resulta posible añadirle un término lineal más sin alterar w_0 y w_1 , dando lugar al estimador lineal subóptimo $\hat{s}(x_1, x_i) = w_0 + w_1 x_1 + w_i x_i$, $i = 2$ ó 3 . Indíquese si ha de preferirse para ello la v.a. x_2 o la x_3 , y determínese la expresión del correspondiente $\hat{s}(x_1, x_i)$ y el error cuadrático medio de la estimación.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

6.Q9 Un analista ha de determinar una recta de regresión a partir de la siguiente tabla de observaciones

k	1	2	3	4	5	6
$x^{(k)}$	1	2	3	4	5	6
$s^{(k)}$	1.01	1.98	2.99	7.11	5.01	6.00

- En un primer momento, el analista no visualiza los datos y aplica rutinariamente la formulación para resolver el problema. Determinése la recta de regresión que obtiene y los correspondientes valores de los residuos para cada uno de los puntos observados.
- A la vista de los valores de los residuos, el analista concluye que es altamente probable que una muestra esté fuera de margen. ¿Cuál es esa muestra? El analista la elimina y diseña una nueva recta de regresión. Determinése dicha recta y los correspondientes valores de los residuos.

6.Q10 Se dispone de un conjunto de N vvaas $\{x_n\}$ de medias nulas y ortonormales (normales ($v_{x_n x_n} = 1$) y ortogonales entre sí). Se desea estimar otra va de media nula, s , mediante una combinación lineal de las $\{x_n\}$, minimizando el error cuadrático medio.

- Establézcase la expresión de dicho estimador, $\hat{s}_{\text{lms}}(\{x_n\})$ en función de las covarianzas $\{v_{x_n s}\}$, así como la del valor del error cuadrático medio correspondiente, $E\{\hat{e}_{\text{lms}}^2(\{x_n\})\}$. ¿Hay alguna restricción para las $\{v_{x_n s}\}$?
- Como es sabido, en la práctica hay que estimar las covarianzas. Sean $\{\hat{v}_{x_n s}\}$ los valores estimados. En realidad, $\{x_n\}_{n=n_0}^N$ son ortogonales a s . ¿Cuánto se incrementa el error cuadrático medio por incluirlas en el estimador empírico, $\hat{s}_{\text{lms emp}}(\{x_n\})$? ¿Puede ser importante dicho incremento?

6.Q11 Se lleva a cabo la transformación invertible $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$ sobre la va \mathbf{x} que, utilizada para estimar lms la va \mathbf{s} , da lugar a $\hat{s}_{\text{lms}}(\mathbf{x}) = w_0 + \mathbf{w}^T \mathbf{x}$.

Determinése $\hat{s}_{\text{lms}}(\mathbf{y})$ en función de w_0 , \mathbf{w} , \mathbf{A} y \mathbf{b} . Coméntese el resultado.

6.Q12 El estimador lineal mmse de una va s en función de las vvaas observadas \mathbf{x} es

$$\hat{s}_{\text{lms}}(\mathbf{x}) = \hat{\mathbf{w}}_e^T \hat{\mathbf{x}}_e = w_0 + \mathbf{w}^T \mathbf{x}.$$

- Se utiliza erróneamente el estimador $\tilde{s}(\mathbf{x}) = \alpha \hat{s}_{\text{lms}}(\mathbf{x})$, $0 < \alpha < 1$. ¿Cuánto aumenta el mse de la estimación?
- Se utiliza erróneamente un estimador $\check{s}(\mathbf{x})$ que ha perdido la componente $w_n x_n$ incluida en $\hat{s}_{\text{lms}}(\mathbf{x})$. ¿Cuánto aumenta el mse de la estimación?

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

ii) Diseñado $\widehat{s}_{\text{lms}}(x)$, la interferencia desaparece, observándose

$$x' = s + n$$

Calcúlese $E\{[s - \widehat{s}_{\text{lms}}(x')]^2\}$.

iii) ¿Por qué es menor $E\{[s - \widehat{s}_{\text{lms}}(x')]^2\}$ que $E\{[s - \widehat{s}_{\text{lms}}(x)]^2\}$?

iv) Sea el estimador lms para la situación descrita en ii) $\widehat{s}'_{\text{lms}}(x')$; compruébese que $E\{[s - \widehat{s}'_{\text{lms}}(x')]^2\}$ es menor que $E\{[s - \widehat{s}_{\text{lms}}(x')]^2\}$.

6.E1 Sean s, x_1 y x_2 tres variables aleatorias de medias nulas tales que:

- la matriz de covarianzas de x_1 y x_2 es:

$$\mathbf{V}_{xx} = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$$

- el vector de covarianzas cruzadas de s con x tiene como expresión:

$$\mathbf{v}_{sx} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

a) Calcúlense los coeficientes w_1 y w_2 del estimador

$$\widehat{s}_{\text{lms}} = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

b) Determínese el valor cuadrático medio del error de estimación.

c) Discútase el papel de la variable x_2 , que, según se ve, está incorrelacionada con la variable s a estimar.

6.E2 Se desea estimar la variable aleatoria s mediante una combinación lineal de las x_1, x_2, x_3 , de modo que se minimice el error cuadrático medio. Todas las variables tienen media nula y se sabe que:

$$\begin{aligned} v_{x_i x_i} &= 1, & \forall i \\ v_{x_1 x_2} &= \rho \\ v_{x_1 x_3} &= 0 \\ v_{x_2 x_3} &= 0 \\ v_{s x_1} &= 1 \\ v_{s x_2} &= 1/2 \\ v_{s x_3} &= 1 \end{aligned}$$

(v_{ss} es suficientemente grande para permitir el margen de variación que realmente tenga ρ).



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

6.E3 Se presentan en la tabla los valores observados de un índice s de rendimiento de un proceso químico en función de la medida x de una de las materias primas utilizadas, realizándose 7 observaciones por medida.

x	20	22	24	26
s	120	112	139	140
	106	134	121	152
	109	120	122	162
	103	119	121	133
	122	120	123	148
	105	112	135	148
	107	121	126	136

- Determinése la recta de regresión de s sobre x .
- Calcúlense los residuos.

6.E4 Las vvaas s y $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$ tienen medias nulas y covarianzas dadas por

$$v_{ss} = 1$$

$$\mathbf{v}_{sx} = [1/2 \ 1/2]$$

$$\mathbf{V}_{xx} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Determinése el estimador lineal de error cuadrático medio mínimo $\hat{s}_{lms}(x_1, x_2)$, y calcúlese el correspondiente error cuadrático medio.
- En la captura de las observaciones x_1, x_2 , se producen interferencias, de modo que las variables disponibles resultan ser

$$x'_1 = x_1 + a x_2$$

$$x'_2 = b x_1 + x_2$$
 con $|a|, |b| \ll 1$. El diseñador percibe el problema y obtiene de forma óptima $\hat{s}_{lms}(x'_1, x'_2)$. Determinése la expresión de este segundo estimador y calcúlese el correspondiente error cuadrático medio.
- ¿Por qué se produce la relación existente entre los errores cuadráticos medios de ambos estimadores?
- ¿Qué ocurriría si $a = b = 1$?

6.E5 Se desea estimar la v.a. s a partir de observaciones de las vv.aa. x_1 y x_2 ; es decir, obtener

$$\hat{s}_{lms}(x_1, x_2) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- Calcúlense los coeficientes $\{w_i\}, i = 0, 1, 2$, de $\hat{s}_{lms}(x_1, x_2)$.
- Como se ha visto en a), $v_{sx_2} = 0$ ¿Por qué resulta $w_2 \neq 0$?
- Determinése el valor cuadrático medio del error de estimación cometido al usar $\hat{s}_{lms}(x_1, x_2)$.
- ¿Cómo y cuánto varía el error cuadrático medio si se utiliza $\hat{s}'_{lms}(x_1) = w'_0 + w'_1 x_1$ en vez de $\hat{s}_{lms}(x_1, x_2)$?

6.E6 Un diseñador observa una combinación lineal de una señal s de media cero y varianza v_{ss} con un ruido n de media cero y varianza v_{nn} , incorrelacionado con la señal. El diseñador cree que la situación corresponde a:

$$x = s + n$$

pero en realidad la observación es

$$x_r = hs + n$$

siendo h una constante.

- Indíquese la expresión del estimador lineal mmse que propondrá el diseñador, $\hat{s}(x_r)$, y calcúlese el valor cuadrático medio del error asociado, $e(x_r) = s - \hat{s}(x_r)$.
- Determinése la expresión del estimador que debería emplearse si la h fuera conocida, $\hat{s}_h(x_r)$, y calcúlese el valor cuadrático medio del correspondiente error, $e_h(x_r) = s - \hat{s}_h(x_r)$.
- Si $h > 1$, el error $e(x_r)$ calculado en el apartado i) podría tener un valor cuadrático medio inferior al del error esperado por el diseñador, $e(x)$. ¿Bajo qué condiciones ocurrirá esto?

6.E7 El vector aleatorio $\mathbf{z} = [z_1 \ z_2 \ z_3]^T$ tiene vector de medias

$$E\{\mathbf{z}\} = \mathbf{m}_z = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y matriz de correlaciones

$$E\{\mathbf{z}\mathbf{z}^T\} = \mathbf{R}_{zz} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

- Determinése el estimador lineal de error cuadrático medio mínimo de z_1 dado $\mathbf{z}_r = [z_2 \ z_3]^T$, $\hat{z}_{1lms}(z_2, z_3)$, y calcúlese el correspondiente error cuadrático medio.
- La v.a. z_2 se ve interferida por la z_4 , de modo que se observa

$$z'_2 = z_2 + z_4$$

La v.a. z_4 tiene media nula y varianza 1, y está incorrelacionada con z_2 y z_3 , pero

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

6.E8 Las variables aleatorias s y x obedecen a la ddp conjunta

$$p(s, x) = \begin{cases} 3[1 - (s + |x|)], & s > 0, s + |x| < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Establézcase el estimador de error cuadrático medio mínimo de s dado x , $\hat{s}_{ms}(x)$.
- Determinése el estimador máximo a posteriori de s dado x , $\hat{s}_{map}(x)$.
- Exprésese el estimador de error absoluto medio mínimo de s dado x , $\hat{s}_{abs}(x)$.
- Indíquese el estimador lineal de error cuadrático medio mínimo de s dado x , $\hat{s}_{lms}(x)$.

6.E9 Considérense las vv.aa. s , x_1 , x_2 . La media de s es m_s ; x_1 , x_2 tienen medias nulas. La matriz de covarianzas de dichas variables tiene la forma

$$\begin{bmatrix} V_{ss} & V_{sx_1} & V_{sx_2} \\ V_{x_1s} & V_{x_1x_1} & V_{x_1x_2} \\ V_{x_2s} & V_{x_2x_1} & V_{x_2x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{bmatrix}$$

($|a|, |b|, |c| < 1$).

Un analista conoce los valores a , b , pero cree que $c = 0$, y, de acuerdo con ello, propone un estimador $\hat{s}'_{lms}(x_1, x_2)$ minimizando el error cuadrático medio.

- Establézcase la expresión de $\hat{s}'_{lms}(x_1, x_2)$ y compárese con la del estimador calculado correctamente, $\hat{s}_{lms}(x_1, x_2)$.
- Determinése los errores cuadráticos medios en la aplicación de ambos estimadores, $E\{\hat{e}'^2(x_1, x_2)\} = E\{(s - \hat{s}'_{lms}(x_1, x_2))^2\}$ y $E\{\hat{e}^2(x_1, x_2)\} = E\{(s - \hat{s}_{lms}(x_1, x_2))^2\}$. Compárense dichos errores.

6.E10 Se dispone de los siguientes valores registrados de las magnitudes s y x :

	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$
$x^{(k)}$	0	1	2	3
$s^{(k)}$	0.03	1.12	2.25	3.06

- Un analista cree que x es una variable determinista y decide ligar s con x a través de una regresión lineal convencional.
Establézcase la recta de regresión $\hat{s}_{reg} = w_0 + w_1x$, y estímesese el error cuadrático medio asociado a ella como la varianza muestral de la innovación.
- En realidad, s es una v.a. generada según

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- ii) Calcúlese $E\{(s - \hat{s}_{reg}(x))^2\}$, e indíquense las causas de las diferencias de este valor y los errores cuadráticos anteriores.
- iii) Un segundo analista no conoce la media de n , pero sí el modelo real ($s = x + n$) y que n es exponencial unilateral. El analista decide aplicar el estimador generalizado

$$\hat{s}_{gms}(x) = x + \hat{m}_{ml}$$

siendo \hat{m}_{ml} la estimación ML de la media de n a partir de las observaciones.

Detérminese $\hat{s}_{gms}(x)$ y calcúlese $E\{(s - \hat{s}_{gms}(x))^2\}$. Compárase el valor de este MSE con el asociado al uso de $\hat{s}_{reg}(x)$.

6.E11 La va s obedece al modelo lineal

$$s = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + n$$

siendo x_1, x_2 , variables deterministas y n un ruido gaussiano blanco de media nula.

Se dispone de las siguientes observaciones etiquetadas:

k \	1	2	3	4
$x_1^{(k)}$	0	1	1	0
$x_2^{(k)}$	1	0	1	2
$s^{(k)}$	1.01	0.98	1.96	2.03

- i) Detérminense los coeficientes \hat{w}_0, \hat{w}_1 y \hat{w}_2 del estimador

$$\hat{s}(x_1, x_2) = \hat{w}_0 + \hat{w}_1x_1 + \hat{w}_2x_2$$

obtenido mediante regresión lineal.

- ii) Calcúlense los errores de regresión $\hat{e}(x_1, x_2) = s - \hat{s}(x_1, x_2)$ para las observaciones disponibles.
- ii) Se dispone únicamente de las observaciones de x_1 y s , y se lleva a cabo la correspondiente regresión lineal para obtener

$$\hat{s}(x_1) = \hat{w}'_0 + \hat{w}'_1x_1$$

Detérminense los coeficientes de este estimador.

- iv) Calcúlense los errores de regresión $\hat{e}(x_1) = s - \hat{s}(x_1)$ para las observaciones disponibles.
- v) Discútanse las diferencias entre ambos modelos.

Nota

Recuérdese que la inversa de una matriz A es

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

6.E12 Las vvaas s, x , tienen varianzas unitarias, y sus ddps (marginales) $p(s), p(x)$, son funciones pares.

i) Un analista decide estimar s a la vista de x mediante un modelo cuadrático

$$\hat{s}_2(x) = w_0 + w_1x + w_2x^2$$

minimizando el mse.

Determinense los valores de los coeficientes w_0, w_1, w_2 en función de v_{sx}, v_{sx^2} y $v_{x^2x^2}$.

ii) Calcúlese el mse de la estimación anterior, $E\{e_2^2(x)\} = E\{(s - \hat{s}_2(x))^2\}$.

iii) ¿Cuánto aumenta el mse si se emplea un estimador lineal

$$\hat{s}_1(x) = w'_0 + w'_1x$$

de mínimo mse?

iv) Supóngase que

$$p(s, x) = G\left(\begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & v_{sx} \\ v_{sx} & 1 \end{bmatrix}\right)$$

¿Qué forma $\hat{s}_{2G}(x)$ toma el decisor establecido en i)? ¿Se podría prever el resultado?

6.A1 Las vv.aa s, x tienen una distribución conjunta

$$G\left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} v & \rho v \\ \rho v & v \end{bmatrix}\right).$$

Un analista desea diseñar un estimador lineal de s a la vista de x que proporcione mínimo error cuadrático medio; pero no conoce la distribución conjunta. Recurre a sustituir en la formulación teórica correspondiente los estadísticos reales ($E\{s\}, E\{x\}, v_{xx}, v_{sx}, v_{ss}$) por sus estimaciones muestrales ($\bar{s}, \bar{x}, \bar{v}_{xx}, \bar{v}_{sx}, \bar{v}_{ss}$) obtenidas a partir de un conjunto de datos etiquetados. En particular, el analista obtiene $\bar{x} = C$.

- Establézcase la expresión del estimador lineal teórico que proporciona el error cuadrático medio mínimo, $\hat{s}_{lms}(x)$, y determínese el valor de dicho error cuadrático medio mínimo, $E\{e_{lms}^2(x)\}$
- Determínese la expresión del estimador lineal diseñado por el analista, $\hat{s}_a(x)$, y calcúlese en cuánto excede el correspondiente error cuadrático medio, $E\{e_a^2(x)\}$, del anterior $E\{e_{lms}^2(x)\}$.
- Tras realizar el diseño de $\hat{s}_a(x)$, el analista percibe, por consideraciones físicas, que s y x tienen medias nulas, y diseña un nuevo estimador, $\hat{s}'_a(x)$, calculando las varianzas muestrales teniéndolo en cuenta. ¿En qué difiere $\hat{s}'_a(x)$ de $\hat{s}_a(x)$?

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Tema 7: “Métodos analíticos, semianalíticos y máquina”

7.Q1 En un problema de decisión binaria, H_1 es una hipótesis compuesta:

$$p(x|\theta, H_1) = \theta \exp(-\theta x)u(x)$$

siendo

$$p(\theta|H_1) = \beta\delta(\theta - 1) + (1 - \beta)\delta(\theta - 2), \quad 0 < \beta \leq 1$$

mientras que

$$p(x|H_0) = 2 \exp(-2x)u(x)$$

a) Verifíquese que el LRT puede reducirse a la forma

$$\begin{array}{l} D_1 \\ x \geq U \\ D_0 \end{array}$$

estableciendo el valor de U en función del umbral η del LRT y de β . ¿Cómo debe ser U para que el problema tenga sentido?

b) Elíjase el valor de U preciso para que P_{FA} sea α .

c) Para el valor de U fijado en b), calcúlese P_D .

7.Q2 Un problema de decisión binaria de hipótesis compuestas y equiprobables se caracteriza por

$$p(x|\theta_i, H_i) = G(x|\theta_i, v)$$

$$p(\theta_i|H_i) = G(\theta_i|0, v_i)$$

$i = 0, 1; v_1 > v_0$. Diseñese el decisor MAP (ML).

(Sugerencia: téngase en cuenta que una va siempre se puede expresar como su media más una va de idéntica densidad de probabilidad pero con media 0).

7.Q3 Las verosimilitudes de un problema compuesto de decisión binaria son:

$$p(x|a, H_1) = a \exp(-ax)u(x), \quad a > 0$$

$$p(x|H_0) = \exp(-x)u(x)$$

siendo a un parámetro determinista.

Como se sabe, existe un UMPT si es posible definir el decisor salvo por el valor del umbral (que se puede establecer según las prestaciones deseadas).

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

7.Q4 Se han de clasificar observaciones x correspondientes a una de las hipótesis

$$H_1 : p(x|H_1) = G(x|m, v)$$

$$H_0 : p(x|H_0) = G(x| - m, v)$$

siguiendo el criterio MAP.

- i) Establézcase la expresión del clasificador.
- ii) En la práctica, m , v y las probabilidades a priori son desconocidas, y se opta por aplicar un GLRT estimando m y v mediante máxima verosimilitud a partir de muestras tomadas independientemente, K_0 bajo la hipótesis H_0 , $\{x^{(0,k_0)}\}_{k_0=1}^{K_0}$, y K_1 bajo H_1 , $\{x^{(1,k_1)}\}_{k_1=1}^{K_1}$; mientras que $Pr(H_0)$ y $Pr(H_1)$ se estiman mediante frecuencias relativas (que, al fin y al cabo, son estimaciones ML).
Calcúlense los correspondientes estimadores, \hat{m}_{ml} , \hat{v}_{ml} , $\hat{Pr}_{ml}(H_0)$ y $\hat{Pr}_{ml}(H_1)$; y exprese-se en función de las muestras el clasificador GLRT.

7.Q5 Las vvaas s, x , son conjuntamente gaussianas:

$$p(s, x|m) = G \left(\begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ m \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} \right)$$

donde ρ es un parámetro determinista conocido, y m otro, pero desconocido. Se sabe, sin embargo, que $0 < m < 1$.

- i) Diseñese el estimador minimax $\hat{s}_{mM}(x)$, bajo el criterio de minimizar el error cuadrático medio.
- ii) Determinése para ese diseño el máximo incremento de error cuadrático medio respecto al óptimo, Δ_{max} .

7.E1 En un problema de decisión binaria planteado bajo el criterio ML, las verosimilitudes de las observaciones son:

$$p(x|H_0) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = \begin{cases} 1/a, & 0 < x < a \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

siendo $a \geq 1$ un parámetro determinista.

- a) Diseñese el decisor óptimo supuesto que es conocido el valor de a .

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

siendo x_u un umbral de decisión genérico

$$x \underset{D_0}{\overset{D_1}{\geq}} x_u$$

Determinése x_m .

- c) Calcúlese el incremento del coste medio (ML) que se produce al aplicar la estrategia minimax respecto al que se tendría si a fuese conocida.

7.E2 Como se sabe, en el caso de que las observaciones de un problema de decisión se comporten dependiendo de los valores de parámetros deterministas desconocidos se aplican los test de cociente de verosimilitudes generalizados (GLRT), estimando primero los parámetros y aplicando después el LRT que corresponda a los parámetros estimados.

Sean las verosimilitudes de la variable observada

$$p(x|H_0) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = \frac{c}{2} \exp(-c|x-m|)$$

e iguales las probabilidades a priori.

Se realizan cinco observaciones de la variable x bajo cada hipótesis, que toma los valores

- bajo H_0 : $-4, -2, 1, 2$ y 3

- bajo H_1 : $-3, -1, 0, 2$ y 4

- a) Diseñese el GLRT que corresponde a estimar los parámetros desconocidos aplicando el criterio ML y cuyo criterio de diseño es minimizar la probabilidad de error.
- b) Si los valores reales de los parámetros son $a = -4$, $b = 4$, $m = 0$ y $c = 2/5$, calcúlese los valores de P_{FA} y P_M que se obtendrán en la práctica al aplicar el diseño del apartado anterior.

7.E3 En un problema de decisión binaria unidimensional se sabe que la v.a. observada x bajo la hipótesis H_0 responde a una ddp $p(x|H_0)$ de media 0, simétrica y decreciente en torno a la media, con varianza v ; mientras que bajo la hipótesis H_1 pasa a tomar media m_1 , conservando su forma (es decir, $p(x|H_1) = p(x - m_1|H_0)$). Las hipótesis son equiprobables.

- a) Diseñese el decisor ML.
- b) En la práctica, m_1 es desconocida. Un diseñador opta por estimarla mediante la media muestral $\bar{x}_{(1)}$ de K observaciones de x bajo la hipótesis H_1 , $\{x_{(1)}^{(k)}\}_{k=1}^K$, tomadas independientemente: estableciendo a partir de ella un estimador U del umbral teórico y

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- c) Obviamente, U es una v.a. Calcúlense su media y su varianza en función de las de las muestras, m_1 y v .
- d) Se produce falsa alarma:
- si $U > 0$, cuando la v.a. x bajo la hipótesis H_0 supera el valor de la v.a. U ;
 - si $U < 0$, cuando la v.a. x bajo la hipótesis H_0 es inferior al valor de U .
- Explicítese la expresión que permite calcular la media de P_{FA} (es decir, el valor de P_{FA} cuando se repite indefinidamente el proceso de diseño).
- e) Cuando $K \gg 1$ y admitiendo que $p(x|H_0)$ obedece al Teorema Central del Límite, U puede considerarse gaussiana. Suponiéndolo y también que $m_1 = 1$ y

$$p(x|H_0) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

(que no satisface la condición de decrecimiento en torno a la media; pero el diseñador no lo sabe), calcúlense la P_{FA} del diseño empírico (el que maneja U).

- f) ¿A qué tiende la media de la probabilidad de error del diseño empírico del apartado anterior cuando $K \rightarrow \infty$, admitiendo que, por simetría, $P_M \rightarrow P_{FA}$? Compárese con la probabilidad de error del diseño ML supuesto m_1 conocida, $P_e(T)$.

Nota: Empléese la función de error complementario de Van Trees:

$$\text{erfc}(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\infty} \exp(-t^2/2) dt$$

7.E4 El problema de decisión binaria bajo criterio MAP definido por

$$p(x|H_0) = \begin{cases} 1/2, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = \begin{cases} 1/2, & |x - m_1| < 1 \\ 0, & |x - m_1| > 1, \quad 0 < m_1 < 2 \end{cases}$$

tiene como solución, obviamente:

$$\begin{aligned} x < m_1/2 &\Rightarrow D_0 \\ x > m_1/2 &\Rightarrow D_1 \end{aligned}$$

El valor de m_1 no se conoce, por lo que se decide estimar este parámetro mediante una media

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

7.E5 Un problema compuesto de decisión binaria queda descrito por:

$$\begin{aligned} H_0 &: x = n \\ H_1 &: x = m + n \end{aligned}$$

siendo m un parámetro determinista desconocido y n un ruido de media 0 y varianza 1 cuya distribución puede ser Laplace o Gauss.

Se dispone de los siguientes valores (ordenados) de x bajo la hipótesis H_1 obtenidos mediante tomas independientes, $\{x_1^{(k)}\}$:

$$1.20, 1.04, 0.81, 0.72, 0.50, 0.36, -0.11, -0.38, -0.54$$

La política de costes viene dada por $C_{01} = C_{10} = 3$, $C_{10} = C_{11} = 1$, y las hipótesis son equiprobables.

- a) Un diseñador supone en principio que n es Gauss, y diseña un GLRT estimando m por máxima verosimilitud, \hat{m}_{mlg} . Calcúlese dicho valor estimado y establézcase el correspondiente decisor bayesiano.
- b) Posteriormente, el diseñador percibe que las desviaciones de los valores observados respecto a \hat{m}_{mlg} ($\{|x_1^{(k)} - \hat{m}_{mlg}|\}$) son excesivamente altas para una distribución gaussiana de varianza unitaria, y procede a elegir entre las opciones de n Gauss y n Laplace aplicando un GLRT estimando m por máxima verosimilitud bajo cada opción: el ya calculado \hat{m}_{mlg} para el gaussiano y \hat{m}_{mll} para el laplaciano; estableciendo el umbral según el criterio ML.
 - b1) Determinése qué modelo (Gauss o Laplace) resulta elegido al aplicar el GLRT.
 - b2) Empleando el modelo elegido en b1), obténgase el correspondiente decisor para el problema compuesto original.
- c) En realidad $m = 0,6$ y n es Laplace. Calcúlese el coste medio que ahorra la acción del diseñador descrita en b) respecto al uso del diseño inicial indicado en a).

7.E6 Un diseñador ha de implantar un clasificador binario para muestras unidimensionales x . El diseñador conoce la verosimilitud

$$p(x|C_1) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

y también que las clases son equiprobables. El diseñador decide aplicar el criterio de mínima probabilidad de error, y, como dispone de un conjunto de muestras (tomadas independientemente unas de otras) correspondientes a la clase C_0

$$x^{(1)} = 0.06, x^{(2)} = 0.11, x^{(3)} = 0.28, x^{(4)} = 0.31$$

$$x^{(5)} = 0.42, x^{(6)} = 0.60, x^{(7)} = 0.74, x^{(8)} = 0.90.$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

- a) Determinése \hat{a}_{ML} .
 b) Establézcase el clasificador que ha de usar el diseñador en la forma

$$x \underset{C_0}{\overset{C_1}{\gtrless}} U$$

- c) Estímense las probabilidades de falsa alarma, pérdida y error calculadas a partir del modelo utilizado para diseñar el clasificador; P_{FA1} , P_{M1} y P_{E1} , respectivamente.

En realidad, es

$$p(x|C_0) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

- d) Determinése las verdaderas P_{FA2} , P_{M2} y P_{E2} del diseño anterior.
 e) Compárense las prestaciones del clasificador implementado por el diseñador con las óptimas (P_{FA} , P_M y P_E).

7.E7 En un problema de decisión binaria, $p(x|H_0)$ es $U[0, 1]$, y H_1 es una hipótesis compuesta dependiente de uno o varios parámetros deterministas desconocidos. Se dispone de las siguientes observaciones $\{x_1^{(n)}\}$ de x bajo H_1 tomadas de forma independiente:

0.16, 0.27, 0.31, 0.76, 1.14, 1.92

Las condiciones para la decisión son las de ML.

- i) Un analista opta por diseñar un GLRT estimando los parámetros de la verosimilitud de H_1 por ML, y supone que dicha verosimilitud es uniforme, $U[\alpha, \beta]$. Indíquese el test que obtiene el analista.
 ii) En realidad la verosimilitud de H_1 es Pareto con la forma

$$p(x|d, H_1) = d/x^2, \quad d < x < \infty$$

Indíquese el test que se obtendría mediante el mismo proceso, estimando d por ML.

- iii) Realmente, $d = 0.09$. Calcúlense las prestaciones (P_{FA} , P_M , P_e) que los tests anteriores proporcionarían en la práctica.

7.E8 Un problema compuesto de decisión binaria responde a las verosimilitudes:

$$p(x|\theta, H_1) = \frac{a}{2} \exp(-a|x - \theta m|)$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- i) Establézcase el correspondiente decisor.
- ii) Calcúlense P_{FA} y P_M .

7.E9 En un problema binario de decisión MAP, las verosimilitudes son

$$p(x|H_0) = \frac{1}{2} \exp(-|x|)$$

$$p(x|H_1) = \frac{1}{2} \exp(-|x - m|)$$

siendo $m > \ln 2$.

$\Pr(H_1) = \theta$ se comporta aleatoriamente según

$$p(\theta) = \begin{cases} 2\theta, & 0 < \theta < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- i) Determínese el decisor que minimiza el coste medio y calcúlese el valor del coste medio mínimo, \bar{C}_{opt} .
- ii) Un diseñador cree que θ es determinista, y procede de acuerdo con la estrategia minimax. Determínese el decisor que propone el diseñador y calcúlese el coste medio \bar{C}' que supone aplicarlo en la situación descrita en i).

7.E10 Un problema bidimensional de decisión binaria con hipótesis equiprobables presenta como verosimilitud de la hipótesis nula la gaussiana

$$p(x_1, x_2|H_0) = \frac{1}{\pi} \exp \left[-\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \right]$$

y como verosimilitud de la hipótesis alternativa la mezcla

$$p(x_1, x_2|H_1) = \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{1}{2}[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] \right] + \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{1}{2}[(x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1)^2] \right]$$

- i) Determínese el decisor de mínima probabilidad de error.
- ii) En realidad, los términos de la mezcla anterior corresponden a hipótesis distintas, con verosimilitudes

$$p(x_1, x_2|H'_1) = \frac{2}{\pi} \exp \left[-\frac{1}{2}[(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2] \right]$$

$$p(x_1, x_2|H'_2) = \frac{2}{\pi} \exp \left[-\frac{1}{2}[(x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1)^2] \right]$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

7.E11 Un problema compuesto de estimación gaussiana obedece a la ddp condicional

$$p(s, x_1, x_2 | m_1, m_2) = G \left(\begin{bmatrix} s \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1/2 \\ 1 & 1/2 & 2 \end{bmatrix} \right)$$

siendo m_1, m_2 , variables conjuntamente gaussianas según la ddp

$$p(m_1, m_2) = G \left(\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

- i) Determínese $\hat{s}_{ms}(x_1, x_2)$.
- ii) Un diseñador no modifica los valores de $v_{x_1, x_2 | m_1, m_2} = 1/2$ para calcular el estimador de error cuadrático medio mínimo. Determínese la expresión del estimador que obtiene, $\hat{s}'_{ms}(x_1, x_2)$
- iii) Evalúense los errores cuadráticos medios que se producen aplicando $\hat{s}_{ms}(x_1, x_2)$ y $\hat{s}'_{ms}(x_1, x_2)$

7.E12 Se dispone de N medidas tomadas independientemente $\{\mathbf{x}^{(n)}\}$ de una v.a. \mathbf{x} D -dimensional gaussiana de media $\mathbf{0}$ y dos posibles covarianzas $\text{cov}(x_d x_{d'} | H_i) = v_{idd'} \delta_{dd'}$, $i = 0, 1$, $1 \leq d, d' \leq D$.

- i) Establézcase el LRT bajo condiciones ML que decide cuál de las dos hipótesis es cierta.
- ii) Compruébese que los estadísticos $\{y_{Nd}\}_{d=1}^D$ definidos en la forma $y_{Nd} = \sum_n x_d^{(n)2}$, $1 \leq d \leq D$, son suficientes para cualesquiera valores de las covarianzas que se están considerando.
- iii) Suponiendo $D = 2$, $v_{111} = v_{112} = 2$, $v_{011} = v_{012} = 1$, determínense las regiones de decisión en el plano y_{N1}, y_{N2} .

7.E13 Un problema doblemente compuesto de decisión binaria unidimensional está caracterizado por

$$p(x | \theta, H_0) = \theta \exp(-\theta x) u(x)$$

$$p(x | a, H_1) = \begin{cases} 1/(x - a + 1)^2, & \text{si } x > a \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

siendo θ una v.a. con d.d.p.

$$p(\theta) = \exp(-\theta) u(\theta)$$

y a un parámetro determinista. Las hipótesis son equiprobables.



**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

iv) Se dispone de las observaciones de x bajo la hipótesis H_1 :

$$x^{(1)} = 2.31; \quad x^{(2)} = 3.11; \quad x^{(3)} = 2.96; \quad x^{(4)} = 2.20; \quad x^{(5)} = 2.57$$

tomadas independientemente.

Establézcase el GLRT bajo criterio MAP correspondiente a la estimación ML del parámetro a .

v) Si en realidad $a = 2$, bajo el criterio MAP, ¿es mejor el decisor minimax o el GLRT obtenido en iv)?

7.E14 Las verosimilitudes de las hipótesis en un test binario son

$$p(x_1, x_2 | H_0) = \begin{cases} 2, & 0 < x_2 < x_1 < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p(x_1, x_2 | H_1) = \begin{cases} 6x_2, & 0 < x_2 < x_1 < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

Las hipótesis son equiprobables y se desea decidir minimizando la probabilidad de error.

- i) La x_2 no es observable –de modo que ha de considerarse como un parámetro aleatorio.– Establézcase el decisor óptimo a la vista de x_1 , y calcúlense sus probabilidades de falsa alarma, P_{FA_1} , de pérdida, P_{M_1} , y de error, P_{e_1} .
- ii) No es observable x_1 . Determínese el decisor óptimo en función de x_2 , así como P_{FA_2} , P_{M_2} y P_{e_2} .
- iii) Ambas vvaas pueden observarse. Diseñese el decisor óptimo y calcúlense P_{FA_T} , P_{M_T} y P_{e_T} .

7.E15 La ddp conjunta de las vv.aa. s, x , tiene la forma

$$p(s, x) = \begin{cases} 2/a^2, & 0 < s < x < a \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

donde a es un parámetro determinista desconocido. Se dispone también de un conjunto de K muestras $\{s^{(k)}, x^{(k)}\}$, tomadas independientemente unas de otras.

- i) Determínense $\hat{s}_{\text{ms}}(x)$ y $\hat{s}_{\text{lms}}(x)$.
- ii) Establézcase el valor de $\hat{a}_{\text{ml}}(\{s^{(k)}, x^{(k)}\})$.
- iii) Determínese el estimador generalizado ML $\hat{s}_{\text{glms}}(x)$, que se obtiene sustituyendo los momentos de 1^{er} y 2^o orden en la expresión general de $\hat{s}_{\text{lms}}(x)$ por sus valores reales

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

7.E16 Un problema compuesto de decisión binaria con hipótesis equiprobables responde a las verosimilitudes totales

$$p(x, \theta|H_1) = x \exp[-(x + \theta)] u(x)u(\theta)$$

$$p(x, \theta|H_0) = \frac{1}{2}(x + \theta) \exp[-(x + \theta)] u(x)u(\theta)$$

siendo θ la va no observable. La política de costes es $C_{01} = C_{10} = 2$, $C_{00} = C_{11} = 1$.

- i) Diseñese el decisor óptimo.
- ii) Calcúlense P_{FA} y P_M .
- iii) Si θ fuese observable, ¿cuál sería el decisor óptimo y cuánto valdrían las probabilidades de falsa alarma y de pérdida, P'_{FA} y P'_M ?

7.E17 En un problema de decisión ternaria las verosimilitudes son:

$$p(x|H_0) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p(x|H_2) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

y las probabilidades a priori, $\Pr(H_0) = \theta$, $\Pr(H_1) = \Pr(H_2) = \frac{1-\theta}{2}$. θ ($0 < \theta < 1$) es un parámetro determinista desconocido.

- i) Diseñese el decisor minimax correspondiente al criterio MAP.
- ii) Calcúlese la probabilidad de error correspondiente.

7.E18 Se ha de diseñar un decisor binario ML para una situación en que las verosimilitudes tienen las formas:

$$\text{– bajo } H_1: \quad p_1(x, y|\theta) = \frac{1}{\theta^2} \exp[-(x + y)/\theta] u(x)u(y)$$

$$\text{– bajo } H_0: \quad p_0(x, y|\theta) = \frac{2x}{\theta^3} \exp[-(x + 2y)/\theta] u(x)u(y)$$

donde θ es un parámetro determinista positivo.

- i) Diseñese el decisor suponiendo que θ es conocido. Representense aproximadamente las regiones de decisión X_0 , X_1 , referidas a las coordenadas $(x/\theta, y/\theta)$.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

7.E19 Un problema compuesto de decisión binaria queda caracterizado por la equiprobabilidad de las hipótesis, la verosimilitud

$$p(x|H_0) = 2\Pi(2x - 1) = \begin{cases} 2, & 1/4 < x < 3/4 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

y la verosimilitud conjunta

$$p(x, \theta|H_1) = \begin{cases} 1, & -1/2 < x < 1/2, & 0 < \theta < x + 1/2 \\ 1, & 1/2 < x < 3/2, & x - 1/2 < \theta < 1 \\ 0, & & \text{eoc} \end{cases}$$

donde θ es una va no observable.

- i) Establézcase el decisor de mínima probabilidad de error.
- ii) Calcúlense las P_{FA} y P_M que proporciona dicho decisor.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tema 8: “Estimación de densidades de probabilidad”

8.D1 Demuéstrese por inducción que, si $f(\cdot)$ es cóncava (queda por debajo de sus cuerdas)

$$\sum_{l=1}^L \rho_l f(x_l) \geq f\left(\sum_{l=1}^L \rho_l x_l\right)$$

siendo $\{\rho_l\}$ los coeficientes de combinación convexa: $0 \leq \rho_l \leq 1$, $\sum_{l=1}^L \rho_l = 1$. (Para ello, primero tendrá que verificarse para $L = 2$, y después probarse que, si se cumple para un cierto número natural, también debe cumplirse para el siguiente).

A partir de ello, demuéstrese que la mezcla

$$p(x) = \sum_{l=1}^L \rho_l p_l(x)$$

tiene una varianza v mayor que la combinación convexa $\sum_{l=1}^L \rho_l v_l$ de las varianzas de sus componentes, $v_l = \int (x - m_l)^2 \rho_l(x) dx$.

$$(m_l = \int x \rho_l(x) dx)$$

8.D2 Establézcase la expresión general de un clasificador K-NN standard M -ario con política de coste $\{C_{cm}\}$ (C_{cm} : coste de elegir c cuando es cierto m), $1 \leq m, c \leq M$, probabilidades a priori $\Pr(H_m)$ y números de ejemplos $\{K_m\}$.

Particularícese dicho clasificador para la situación MAP, admitiendo que $\Pr(H_m)$ puede reemplazarse por K_m/K . ¿Qué ocurre si M es un valor elevado?

8.D3 Indíquese la expresión general de un clasificador binario D -dimensional por vecinos más próximos basado en el empleo de regiones hiperesféricas V_{R_i} , $i = 0, 1$, alrededor de la muestra a clasificar que contengan el mismo número k de ejemplos disponibles de cada clase para el diseño, que son $\{x^{(k_0)}\}_{k_0=1}^{K_0}$ y $\{x^{(k_1)}\}_{k_1=1}^{K_1}$.

8.Q1 Un problema unidimensional binario de hipótesis equiprobables presenta las siguientes verosimilitudes:

$$p(x|H_0) = \begin{cases} 1/4, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$p(x|H_1) = \begin{cases} 1/2, & 3 < x < 5 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

El diseñador aplica un decisor tipo 1-NN para clasificar las muestras posteriores. Indíquense los márgenes de valores de x para los que el esquema 1-NN llevará a tomar las decisiones D_0 y D_1 .

- c) A partir de lo anterior, calcúlense las características P'_{FA} , P'_M y P'_e para el decisor 1-NN, y compárense los resultados con los del decisor óptimo calculado en a).
- d) Explíquese lo que ocurriría si el diseñador pudiese tomar un número muy elevado de muestras etiquetadas para utilizarlas con el esquema 1-NN, dando aproximaciones para P''_{FA} , P''_M y P''_e .

8.Q2 Para resolver un problema de clasificación binaria tridimensional con hipótesis equiprobables se dispone de 15 muestras etiquetadas de cada clase. La política de costes a aplicar es la que corresponde a minimizar la probabilidad de error de clasificación.

Se desea clasificar la muestra

$$\mathbf{x}^* = [0.8 \ 0.3 \ 0.5]^T$$

cuyos tres vecinos más próximos resultan ser

$$\mathbf{x}^{(1)} = [0.8 \ 0.45 \ 0.7]^T, \text{ clase } -1$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = [0.5 \ 0.3 \ 0.5]^T, \text{ clase } 1$$

$$\mathbf{x}^{(3)} = [0.6 \ 0.5 \ 0.7]^T, \text{ clase } 1$$

- a) Clasifíquese \mathbf{x}^* aplicando el clasificador 3NN para la política de costes dada.
- b) Estímense $p(\mathbf{x}^*|1)$ y $p(\mathbf{x}^*|-1)$ vía 1NN utilizando como regiones para la aproximación las esferas de mínimo volumen centradas en \mathbf{x}^* .
- c) Utilícense las estimaciones del apartado anterior para clasificar \mathbf{x}^* .

8.Q3 Considérese la mezcla

$$p_\lambda(s, x) = [\lambda a^2 \exp[-a(s+x)] + (1-\lambda)b^2 \exp[-b(s+x)]] u(s)u(x)$$

donde $a, b > 0$, y, como se sabe, el parámetro de mezcla λ está restringido a $0 \leq \lambda \leq 1$.

- i) Determínese $\hat{s}_{ms,\lambda}(x)$.
- ii) ¿Qué ocurre si $\lambda \rightarrow 0$, y si $\lambda \rightarrow 1$?

8.Q4 Considerése la mezcla

$$p(s, x) = \lambda G\left(\begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} m \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{I}\right) + (1-\lambda)G\left(\begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{I}\right)$$


**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

8.Q5 En un problema unidimensional de decisión binaria se sabe que $p(x|H_0) = G(x|0, 2/\pi)$, pero se desconoce la forma de la verosimilitud de H_1 .

Un diseñador opta por emplear un histograma a partir de las muestras bajo H_1 que tiene disponibles, y, por, razones de estabilidad estadística, elige el que se muestra en la figura.



Determinése el decisor ML que se deriva del estimador no paramétrico de $p(x|H_1)$ correspondiente a dicho histograma.

8.Q6 Se dispone de las siguientes muestras de una v.a. bidimensional con d.d.p. desconocida:

$$\mathbf{x}^{(1)} = [0.31, 0.77]^T; \quad \mathbf{x}^{(2)} = [-0.55, 0.17]^T; \quad \mathbf{x}^{(3)} = [-0.74, 0.53]^T$$

$$\mathbf{x}^{(4)} = [-0.90, 0.03]^T; \quad \mathbf{x}^{(5)} = [0.18, -0.61]^T; \quad \mathbf{x}^{(6)} = [0.33, 0.88]^T$$

$$\mathbf{x}^{(7)} = [0.75, -0.34]^T; \quad \mathbf{x}^{(8)} = [0.82, 0.27]^T; \quad \mathbf{x}^{(9)} = [0.66, 0.80]^T$$

Un analista decide estimar dicha d.d.p. mediante el método de Parzen

$$\hat{p}(\mathbf{x}) = \frac{1}{Kh^2} \sum_k w \left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}}{h} \right)$$

y elige para la ventana la forma cuadrada:

$$w \left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}}{h} \right) = \begin{cases} 1, & \text{si } \max_i |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i^{(k)}| < \frac{h}{2} \quad (i = 1, 2) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

fijando el parámetro libre en el valor $h = 1/2$.

i) Calcúlese $\hat{p}(0.5, 0.5)$.

ii) Obviamente, el resultado del apartado anterior no es fiable. Indíquese por qué razón, y

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

H_1 . Un método complementario de ajuste permite estimar la varianza de dichas ventanas por el valor v_1 ($> v_0$).

Las hipótesis son equiprobables.

- i) Establézcase el decisor MAP generalizado.
- ii) ¿Está predeterminado el número de puntos frontera del test?
- iii) ¿Qué decisión corresponde a $x = 0$?

8.E1 Las vvaas s, x , están distribuidas conjuntamente según la mezcla de gaussianas

$$p(s, x) = \lambda G(s, x | \mathbf{0}, \mathbf{V}_1) + (1 - \lambda) G(s, x | \mathbf{0}, \mathbf{V}_2)$$

($0 < \lambda < 1$), donde las matrices de covarianzas tienen las formas

$$\mathbf{V}_i = \begin{bmatrix} v_{ssi} & \alpha_i v_{xxi} \\ \alpha_i v_{xxi} & v_{xxi} \end{bmatrix}$$

$i = 1, 2$.

- i) Determínese el estimador mmse de s a la vista de x , $\hat{s}_{\text{ms}}(x)$. ¿Qué ocurre si $v_{xx1} = v_{xx2}$?
- ii) Determínese el estimador lineal mmse de s a la vista de x , $\hat{s}_{\text{lms}}(x)$. ¿Qué ocurre si $v_{xx1} = v_{xx2}$?

8.E2 Un analista ha de testar tres hipótesis H_i , $i = 0, 1, 2$, y sabe que sus probabilidades a priori son $\Pr(H_0) = \Pr(H_1) = 1/4$, $\Pr(H_2) = 1/2$. Puede observar una va x estadísticamente relacionada con las hipótesis, pero no conoce la forma de las verosimilitudes, por lo que mide valores de x bajo cada H_i y construye histogramas $h_1(x|H_i)$ que registran en número de observaciones en intervalos. El analista elige 4 intervalos iguales en $(0, 8)$, y así obtiene:

$$h_1(x|H_0) = \begin{cases} 6, & 0 < x < 2 \\ 5, & 2 < x < 4 \\ 4, & 4 < x < 6 \\ 5, & 6 < x < 8 \end{cases}; \quad h_1(x|H_1) = \begin{cases} 0, & 0 < x < 2 \\ 9, & 2 < x < 4 \\ 8, & 4 < x < 6 \\ 3, & 6 < x < 8 \end{cases}; \quad h_1(x|H_2) = \begin{cases} 5, & 0 < x < 2 \\ 10, & 2 < x < 4 \\ 5, & 4 < x < 6 \\ 0, & 6 < x < 8 \end{cases}$$

A partir de ello, el analista diseña el test MAP semianalítico.

- i) Establézcase dicho test.
- ii) Estímese la P_e que proporcionará el test.

Un segundo analista cree que las observaciones son escasas para la resolución que elige el primero, y opta por emplear los intervalos $(0, 4)$ y $(4, 8)$. El segundo analista

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Tema 11: “Sobre los costes”

11.Q1 Demostrar que

$$\frac{\partial C(s, \hat{s})}{\partial \hat{s}} = g(\hat{s}) \operatorname{sgn}(s - \hat{s}), \quad g(\hat{s}) < 0$$

es condición necesaria y suficiente para que el estimador \hat{s}_c asociado a ella coincida con el de error absoluto $\hat{s}_{abs} = \operatorname{med}(s|\mathbf{x})$ (el correspondiente a $C(s, \hat{s}) = |s - \hat{s}|$); utilizando en la demostración (por contradicción) de la necesidad una distribución uniforme genérica.

11.Q2 Considérense las tres ddp conjuntas de s, x :

$$p_A(s, x) = \begin{cases} 6s, & 0 < x < 1, 0 < s < x \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p_B(s, x) = \begin{cases} 3|x|/2, & -1 < x < 1, 0 < s < |x| \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p_C(s, x) = \begin{cases} \frac{1}{x(1-x)}, & 0 < x < 1, x^2 < s < x \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

y las tres funciones de coste:

$$C_1(\hat{s}, s) = (\hat{s} - s)^2$$

$$C_2(\hat{s}, s) = |\hat{s} - s|$$

$$C_3(\hat{s}, s) = 3\hat{s}^4 - 4\hat{s}^3 s$$

- i) ¿Cuáles de los estimadores \hat{s}_{C_i} ($i = 1, 2, 3$) coincidirán para cada uno de los casos A, B, C?
- ii) Determinéense las expresiones de los estimadores.

11.Q3 Las vv.aa. s, x , siguen la ddp conjunta

$$p(s, x) = \begin{cases} \frac{3}{52} [9 - (s - x - 1)^2], & 0 < x < 1, x < s < x + 2 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

11.Q4 La va s_i se genera a partir de los valores de la va x mediante

$$s_i = f(x) + g^2(x)y_i, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

siendo y_i una va independiente de x con ddp

$$p(y_1) = G(y_1|0, v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left(-\frac{y_1^2}{2v}\right)$$

$$p(y_2) = L(y_2|0, a) = \frac{a}{2} \exp(-a|y_2|)$$

$$p(y_3) = EU(y_3|0, a) = a \exp(-ay_3) u(y_3)$$

$$p(y_4) = U(y_4|a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < y_4 < b \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Determinéense las ddps a posteriori $p(s_i|x)$, $i = 1, 2, 3, 4$, e indíquese en qué casos se cumple la condición para aplicar el primer principio de invarianza.
- ii) Calcúlense los estimadores de error cuadrático medio mínimo y de error absoluto medio mínimo de s_i dado x , $\hat{s}_{ims}(x)$ y $\hat{s}_{ima}(x)$.

11.Q5 Sea

$$p(s, x) = \begin{cases} \frac{9}{2}x^2s^2, & -1 < x < 1, \quad -|x| < s < |x| \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

Determinéense la expresión general de los estimadores $\hat{s}_r(x)$ que minimizan el valor medio del coste genérico

$$C_r = |\hat{s} - s|^r$$

($r \geq 1$). ¿Por qué no hay dependencia de r ?

11.Q6 Un analista supone que la ddp conjunta de s, x , es

$$p_A(s, x) = \begin{cases} 3, & 0 < s < x^2 < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

pero en realidad

$$f\left(\frac{8}{s} + \frac{10}{s}, \quad 0 < s < x^2 < 1\right)$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

11.E1 Las vv.aa. s y x tienen una ddp conjunta

$$p(s, x) = \begin{cases} a_f, & 0 < s < f(x) \text{ y } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

siendo a_f una constante.

Se desea estimar s a la vista de x mediante estimadores lineales de la forma

$$\hat{s}_i = w_i x, \quad i = 1, 2$$

empleando funciones de coste $C_i(s, \hat{s}_i)$ que cumplen

$$\frac{\partial C_1(s, \hat{s}_1)}{\partial \hat{s}_1} = -(s - \hat{s}_1)$$

$$\frac{\partial C_2(s, \hat{s}_2)}{\partial \hat{s}_2} = -\hat{s}_2(s - \hat{s}_2)$$

- a) Sea $f(x) = f_1(x) = x$
 - a1. Determínese a_{f1} .
 - a2. Determínense los valores de los coeficientes $\{w_i\}_{i=1,2}$, que minimizan los costes medios correspondientes a las funciones de coste indicadas.
- b) Sea $f(x) = f_2(x) = x^2$
 - b1. Determínese a_{f2} .
 - b2. Determínense los valores de los coeficientes $\{w_i\}_{i=1,2}$, que minimizan los costes medios correspondientes a las funciones de coste indicadas.
 - b3. Discútase en qué se diferencia esta situación de la que se produce en el apartado a).

11.E2 La d.d.p. conjunta de las vv.aa. s y x sigue la forma:

$$p(s, x) = \alpha, \quad -1 < x < 1, \quad 0 < s < |x|$$

- a) Determínese la d.d.p. de la v.a. x , $p_X(x)$, especificando el valor de α .
- b) Establézcanse las expresiones de los estimadores de s en función de x que minimizan los costes cuadrático medio ($\bar{C}_{ms} = E\{(s - \hat{s})^2\}$) y absoluto medio ($\bar{C}_{ab} = E\{|s - \hat{s}|\}$), \hat{s}_{ms} y \hat{s}_{ab} , respectivamente.
- c) Supuesto que se restringe la forma de los estimadores a cuadrático en x , establézcanse las expresiones de los estimadores $\hat{s}_{qms} = w_1 x^2$ y $\hat{s}_{qab} = w_2 x^2$ que minimizan los costes antes mencionados (cuadrático y absoluto medios, respectivamente).

11.E3 Se desea estimar la va s a la vista de los valores que tiene la va x . Se cree que la ddp

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

permitidos por $\hat{p}_1(s, x)$ y, por precaución, elige el estimador de error absoluto medio mínimo, $\hat{s}_{1ma}(x)$.

En realidad, la ddp conjunta de s y x es

$$p(s, x) = \begin{cases} 1/(1-x^2), & 0 < x < 1, x^2 < s < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determinense los estimadores $\hat{s}_{1ms}(x)$ y $\hat{s}_{1ma}(x)$, y compárense sus valores. ¿Sirve de algo la precaución del diseñador 2?
- Establézcase la expresión de $\hat{s}_{ms}(x)$, y compruébese que sus valores están por encima de $\hat{s} = x$, y, por tanto, de los de $\hat{s}_{1ms}(x)$ y $\hat{s}_{1ma}(x)$.

11.E4 Las vv.aa. s, x , se distribuyen conjuntamente según

$$p(s, x) = \begin{cases} 2, & 0 < s < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- Determinense los estimadores mmse y mmae de s a la vista de $x, \hat{s}_{ms}(x)$ y $\hat{s}_{ma}(x)$.
- Sobre la va s se superpone una interferencia impulsiva de valor (determinista) muy alto $i \gg 1$ y probabilidad de aparición baja $(0 <) \alpha \ll 1$.
¿Qué forma pasa a tener la ddp conjunta de s, x , bajo tal interferencia, $p_i(s, x)$?
- Determinense los estimadores mmse y mmae de s dado x en presencia de la interferencia, $\hat{s}_{msi}(x)$ y $\hat{s}_{mai}(x)$. ¿En cuál de ellos es mayor el efecto de la interferencia?

11.E5 Considérense las ddp

$$p_1(s, x) = \begin{cases} 6s, & 0 < s < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$p_2(s, x) = \begin{cases} 3x, & 0 < s < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

y los costes

$$\hat{C}_1(\hat{s}, s) = a^2(\hat{s} - s)^2$$

$$\hat{C}_2(\hat{s}, s) = |\hat{s} - s| + b^2$$

$$\hat{C}_3(\hat{s}, s) = \lambda|\hat{s} - s| + (1 - \lambda)(\hat{s} - s)^2, \quad 0 < \lambda < 1$$

Establézcanse las expresiones de los estimadores $\hat{s}_{ij}(x)$, indicando i la ddp y j el coste.

11.A3 El efecto de los valores fuera de margen puede ilustrarse mediante el siguiente ejemplo simplificado.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



- a) Determínese \hat{s}_{ms} .
b) Calcúlese el estimador óptimo \hat{s}_T para la función de coste de Talvar

$$C_T(s - \hat{s}) = \begin{cases} (s - \hat{s})^2, & |s - \hat{s}| < e_0 \\ e_0^2, & |s - \hat{s}| > e_0 \end{cases}$$

con $2e_0 < R$; definiendo los intervalos de valores de x en que ha de aplicarse cada valor de este estimador.

- c) Compárense los dos estimadores obtenidos.

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a stylized map or a splash of paint. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tema 12: “Calidad de estimadores y decisores”

12.D1 Demuéstrase que los estimadores de error cuadrático medio mínimo son insesgados.

12.D2 Demuéstrase que, para cualquier estimador $\hat{s}(\mathbf{x})$:

$$E\{(\hat{s}(\mathbf{x}) - s)^2\} = E\{(\hat{s}(\mathbf{x}) - \hat{s}_{ms}(\mathbf{x}))^2\} + E\{(\hat{s}_{ms}(\mathbf{x}) - s)^2\}$$

12.Q1 Las variables aleatorias s y x siguen una distribución conjunta

$$G\left\{0, \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}\right\}(s, x) \quad (|\rho| < 1)$$

Determinese si existe el estimador absolutamente eficiente de s a la vista de x .

12.Q2 Se toman de manera independiente K muestras $\{x^{(k)}\}$ de la va x cuya ddp tiene la forma

$$p(x|s) = \frac{1}{2s} \exp\left(-\frac{|x|}{s}\right)$$

siendo $s > 0$ un parámetro determinista desconocido.

- i) Calcúlese el estimador de máxima verosimilitud $\hat{s}_{ML}(\{x^{(k)}\})$
- ii) Determinense el sesgo y la varianza del estimador anterior.
- iii) Discútase si el estimador que se está considerando es absolutamente eficiente.

12.Q3 La va x está regida por la ddp

$$p(x|m, d) = \frac{x-d}{m^2} \exp\left(-\frac{x-d}{m}\right) u(x-d)$$

donde d es un valor conocido y m es un parámetro determinista cuyo valor se desconoce.

Se toman K muestras de x independientemente unas de otras, $\{x^{(k)}\}_{k=1}^K$.

- i) Calcúlese $\hat{m}_{ml}(\{x^{(k)}\})$.
- ii) ¿Existe el estimador absolutamente eficiente $\hat{m}_{ae}(\{x^{(k)}\})$? Si existe, ¿cuál es su expresión?

12.Q4 La va x tiene como ddp

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

iii) ¿Es $\hat{v}_{ml}(\{x^{(k)}\})$ absolutamente eficiente?

12.E1 Considérese la observación

$$x = s + r$$

de la señal s inmersa en ruido r ; la señal sigue la distribución exponencial unilateral $E_{\{1,a\}}$

$$p(s) = a \exp(-as)u(s)$$

y el ruido, independiente de s , la distribución Erlang (Gamma) $E_{\{2,a\}}$

$$p(r) = a^2 r \exp(-ar)u(r)$$

- Determinése \hat{s}_{ms} .
- Calcúlese la media $E\{\hat{s}_{ms} - s\}$ y la varianza $\text{Var}\{\hat{s}_{ms} - s\}$ del error, y discútase la influencia de a .

12.E2 El parámetro determinista s es observado a través de

$$x = \sqrt{sr}$$

donde r es un ruido multiplicativo $G(0, v)$. Se realizan K observaciones independientes de x , $\{x^{(k)}\}$.

- Determinése el estimador de máxima verosimilitud \hat{s}_{ml} .
- Calcúlese el sesgo y la varianza de \hat{s}_{ml} .

12.E3 Las vv.aa. s y x obedecen a la ddp conjunta

$$p(s, x) = c, \begin{cases} 0 < s < 1 \\ s < x < 2s \end{cases}$$

siendo c una constante.

- Tras representar el soporte de la ddp, calcúlese el valor de c .
- Establézcanse las expresiones de las ddp marginales $p(s)$ y $p(x)$.
- Determinése analíticamente la forma del estimador de error cuadrático medio mínimo de s a la vista de $x, \hat{s}_{ms}(x)$. Trácese dicha forma sobre la representación del soporte de $p(s, x)$, y discútase si es posible determinarla directamente.
- Calcúlese el error cuadrático medio $E\{e_{ms}^2(x)\}$ que proporciona la aplicación del estimador anterior.
- Determinése la forma del estimador lineal de error cuadrático medio de s a la vista de $x, \hat{s}_{ml}(x)$. Trácese dicha forma sobre la representación del soporte de $p(s, x)$ y coméntese

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

12.E4 Resuélvase el problema de filtrado unidimensional

$$x = s + n$$

es decir, calcúlese $\hat{s}_{ms}(x)$, si s y n son independientes y

a) $p(s) = G(s|m, v_s)$
 $p(n) = G(n|0, v_n)$

a1) ¿Qué ocurre si $m = 0, v_s = v_n = v$?

a2) Determinéense la media y la varianza de $\hat{e}_{msa}(x) = s - \hat{s}_{ms}(x)$ en el caso particular anterior.

b) $p(s) = \prod \left(\frac{s-a/2}{a} \right) = \begin{cases} 1/a, & 0 < s < a \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$

$p(n) = \prod \left(\frac{n-b/2}{b} \right) = \begin{cases} 1/b, & 0 < n < b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$

con $a \geq b$

b1) ¿Qué ocurre si $a = b$?

b2) Determinéense la media y la varianza de $\hat{e}_{msb}(x)$ en el caso particular anterior.

12.E5 Las vvaas s y x se distribuyen conjuntamente según:

$$p_\alpha(s, x) = \alpha G \left(\begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix} \middle| \mathbf{0}, \mathbf{V}_1 \right) + (1 - \alpha) \prod(s)G(x|0, v_{1x})$$

siendo

$$\mathbf{V}_1 = \begin{bmatrix} v_{1s} & v_{1sx} \\ v_{1sx} & v_{1x} \end{bmatrix}$$

y

$$\prod(s) = \begin{cases} 1, & |s| < 1/2 \\ 0, & |s| > 1/2 \end{cases}$$

a) ¿Qué margen de valores puede tomar el parámetro α ?

b) Determinéense los estimadores de error cuadrático medio mínimo para los casos particulares de $p_\alpha(s, x)$ correspondientes a $\alpha = 0$ y a $\alpha = 1$, $\hat{s}_{ms0}(x)$ y $\hat{s}_{ms1}(x)$, respectivamente.

c) Determinéense $\hat{s}_{ms\alpha}(x)$

(Sugerencia: para calcular $I(x) = \int_{-\infty}^{\infty} sG \left(\begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix} \middle| \mathbf{0}, \mathbf{V}_1 \right) ds$, téngase en cuenta que $I(x)/p(x) = \hat{s}_{ms1}(x)$).

d) Calcúlese la media y la varianza del error de estimación $\hat{e}_\alpha(x) = s - \hat{s}_{ms\alpha}(x)$.

e) Determinéense el estimador MAP, $\hat{s}_{map\alpha}(x)$.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



12.E6 Se observa un parámetro determinista m desconocido a través de dos sensores que lo registran como

$$x_1 = m + n_1$$

$$x_2 = m + n_2$$

siendo n_1 y n_2 ruidos gaussianos de medias nulas y varianzas y covarianzas v_1 , v_2 y v_{12} conocidas.

- Establézcase la ddp conjunta $p(x_1, x_2)$.
- Determinése el estimador ML de m, \hat{m} , a la vista de K observaciones $\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}_{k=1}^K$ tomadas independientemente.
- Calcúlense $E\{\hat{m}|m\}$ y $\text{Var}\{\hat{m}|m\}$.
- No se tiene acceso a $x_1^{(k)}$ y $x_2^{(k)}$, sino a las observaciones

$$z_\alpha^{(k)} = \alpha x_1^{(k)} + (1 - \alpha)x_2^{(k)}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1, \quad k = 1, \dots, K$$

(que son combinaciones convexas de las anteriores).

Determinése la ddp de z_α .

- Calcúlese el estimador ML de m a partir de $\{z_\alpha^{(k)}\}_{k=1}^K, \hat{m}_\alpha$. ¿Qué valor de α ha de elegirse para obtener el estimador ML de varianza mínima, \hat{m}_{α^*} , de entre los anteriores?
- ¿Es el estimador obtenido en e) absolutamente eficiente?

12.E7 Se desea caracterizar estadísticamente el estimador de máxima verosimilitud \hat{a}_{ML} del parámetro a de una va x uniformemente distribuida en el intervalo $[0, a]$ obtenido a partir de K observaciones de x , $\{x^{(k)}\}_{k=1}^K$, tomadas independientemente.

- Exprésese \hat{a}_{ML} en función de los valores $\{x^{(k)}\}$.
- En el escenario del apartado a), el valor del estimador cambia cada vez que se elige un conjunto de muestras. Por lo tanto, el estimador es una va \hat{A}_{ML} dependiente de la elección de las K muestras, y se puede caracterizar como tal va.
 - Demuéstrese que la función de distribución de \hat{A}_{ML} es:

$$P_{\hat{A}_{ML}}(\hat{a}_{ML}) = \text{Pr}\{\hat{A}_{ML} \leq \hat{a}_{ML}\} = \left(\frac{\hat{a}_{ML}}{a}\right)^K$$

- Determinése la correspondiente ddp de \hat{A}_{ML} , $p(\hat{a}_{ML})$.
- Calcúlense la media $E\{\hat{A}_{ML}|a\}$ y la varianza $\text{Var}\{\hat{A}_{ML}|a\}$ del estimador. Coméntense los resultados.
- Para estimar los parámetros de vva uniformes es frecuente aplicar el método de los momentos. consistente en estimar su media, varianza, etc., mediante estimadores mues-

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

12.E8 Se dispone de dos mecanismos para observar una variable determinista s , de las que se obtienen observaciones de la forma

$$x_1 = s + n_1$$

$$x_2 = as + n_2$$

siendo $a > 0$ una constante conocida y n_1, n_2 , ruidos gaussianos independientes entre sí, de medias nulas y varianzas conocidas v_1, v_2 , respectivamente.

Se realizan K tomas independientes de dichas observaciones, obteniendo el conjunto $\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}_{k=1}^K$.

- Determinése el estimador de máxima verosimilitud de s , \hat{s}_{mla} , a partir de las observaciones disponibles.
- Calcúlense $E\{\hat{s}_{mla}|s\}$ y $Var\{\hat{s}_{mla}|s\}$.
- Discútase lo que ocurre con lo establecido en i) y ii) si $a \rightarrow 0$ y si a se hace suficientemente grande.
- Compruébese que, sea cual sea el valor de a ($0 < a < \infty$), \hat{s}_{mla} siempre es mejor (presenta menor error cuadrático dado s) que los estimadores ML de s observando sólo $\{x_1^{(k)}\}_{k=1}^K$ o sólo $\{x_2^{(k)}\}_{k=1}^K$.

12.E9 La va s es suma de tres vvaa independientes:

$$s = x_1 + x_2 + x_3$$

siendo las ddps de los sumandos

$$p_{X_j}(x_j) = a \exp(-ax_j)u(x_j), \quad a > 0 \quad j = 1, 2, 3$$

- Determinése $\hat{s}_{ms}(x_1, x_2)$ y $\hat{s}_{map}(x_1, x_2)$.
- Calcúlense las medias y las varianzas de los errores de estimación $e_{ms}(x_1, x_2) = s - \hat{s}_{ms}(x_1, x_2)$ y $e_{map}(x_1, x_2) = s - \hat{s}_{map}(x_1, x_2)$. Coméntense los resultados.
- Determinése $\hat{s}_{ms}(x_1)$ y $\hat{s}_{map}(x_1)$.
- Calcúlense las medias y las varianzas de los errores de estimación $e_{ms}(x_1) = s - \hat{s}_{ms}(x_1)$ y $e_{map}(x_1) = s - \hat{s}_{map}(x_1)$. ¿Es razonable que los errores cuadráticos medios sean mayores que los del apartado ii) para el mismo tipo de estimador?

12.E10 Las vv.aa. s, x, y , tienen la ddp conjunta

$$p(s, x, y) = 6, \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \\ 0 \leq s \leq 1 - x - y \end{cases}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- ii) Como los estimadores anteriores son esperanzas condicionales, están ligados mediante una operación de promediado. Indíquese cuál, y verifíquese que, a través de ella, se obtiene para $\hat{s}_2(x)$ el mismo resultado que en el apartado anterior.
- iii) Calcúlese el valor cuadrático medio de los errores de estimación $e_1 = \hat{s}_1(x, y) - s$ y $e_2 = \hat{s}_2(x) - s$.

12.E11 La va s es la combinación lineal

$$s = x_1 + 3x_2$$

siendo x_1, x_2 , vvaas independientes entre sí con densidades de probabilidad

$$p(x_1) = \frac{1}{m_1} \exp(-x_1/m_1) u(x_1)$$

$$p(x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left(-\frac{(x_2 - m_2)^2}{2v}\right)$$

donde $m_1 > 0$, m_2 y $v > 0$ son valores conocidos, como también lo es la forma de la combinación lineal.

Existe la posibilidad de tomar valores de una de las componentes de s , x_1 o x_2 , para construir estimadores $\hat{s}(x_k)$, $k = 1, 2$.

- i) Establézcanse las expresiones de los estimadores de errores cuadrático y absoluto medios mínimos, $\hat{s}_{ms}(x_1)$, $\hat{s}_{ms}(x_2)$, $\hat{s}_{abs}(x_1)$, $\hat{s}_{abs}(x_2)$.
- ii) Se desea seleccionar el estimador de error cuadrático medio mínimo de entre los cuatro anteriores. ¿Cómo se ha de proceder?
- iii) ¿Cómo se ha de seleccionar el estimador de error absoluto medio mínimo?

12.E12 La va z con distribución gamma de parámetro de forma $N/2$ y parámetro de escala $2v$ tiene como ddp

$$p_N(z) = \frac{1}{(2v)^{N/2} \Gamma(N/2)} z^{N/2-1} \exp(-z/2v) u(z)$$

Esta distribución es también llamada χ^2 general de N grados de libertad.

Supóngase que N es conocido y que se dispone de K muestras de z , $\{z^{(k)}\}$, tomadas independientemente.

- i) Determínese $\hat{v}_{ml}(z^{(k)})$.
- ii) Calcúlense la media y la varianza de \hat{v}_{ml} .
- iii) ¿Es \hat{v}_{ml} absolutamente eficiente?
- iv) Considerando que z puede formarse mediante la suma de los cuadrados de N vvaas gaussianas $\{x^{(k)}\}$ de medias nulas y varianzas iguales v (idénticamente distribuidas) e independientes entre sí ¿eran previsibles los resultados de los apartados anteriores?

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- b) Un analista visualiza muestras de $\{s, x\}$; y supone que su distribución conjunta es una mezcla de dos componentes gaussianas circulares de varianzas iguales v y medias simétricas. La información lateral disponible le dice al analista que las medias son $m\mathbf{1}$ y $-m\mathbf{1}$; y estima v a partir de las muestras, obteniendo el valor \hat{v} .
 Determinése el estimador de error cuadrático medio mínimo $\hat{s}'_{msg}(x)$ que obtiene el analista a partir de lo anterior, y calcúlese $E\{(s - \hat{s}'_{msg}(x))^2\}$.

Nota: $\frac{d}{dz} \ln \cosh(z) = \tanh(z)$

12.E14 Las vvaas s, x presentan la ddp conjunta:

$$p(s, x) = \begin{cases} 1/2 & 0 < s, x < 1 \text{ y } 1 < s, x < 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Calcúlese $\hat{s}_{ms}(x)$ y $E\{(s - \hat{s}_{ms}(x))^2\}$.
- Un diseñador desconoce $p(s, x)$, pero sabe que su media es $[1 \ 1]^T$ y dispone de muestras tomadas independientemente. Opta por estimar muestralmente las componentes de la matriz de covarianzas y proponer un estimador lineal, $\hat{s}'_{lms}(x)$, a partir de los valores estimados. Dichos valores son \hat{v}_{ss} , \hat{v}_{xx} , y $\hat{v}_{sx} = \alpha \hat{v}_{xx}$.
 Indíquense la expresión de $\hat{s}'_{lms}(x)$ y el valor de $E\{(s - \hat{s}'_{lms}(x))^2\}$.
- El número de muestras de que dispone el diseñador es suficientemente alto como para que los valores estimados se aproximen a sus límites sin diferencias apreciables. Bajo tal circunstancia, determínese la expresión del estimador del apartado ii), $\hat{s}'_{lms\infty}(x)$, y $E\{(s - \hat{s}'_{lms\infty}(x))^2\}$.

12.E15 La v.a. s es la superposición

$$s = 2x_1 + x_2 + c$$

donde x_1 y x_2 son vv.aa. independientes con ddps

$$p_1(x_1) = \frac{1}{a} \Pi\left(\frac{x_1}{a}\right) = \begin{cases} 1/a, & |x_1| < a/2 \\ 0, & |x_1| > a/2 \end{cases}$$

$$p_2(x_2) = b \exp(-bx_2)u(x_2)$$

y $b, c > 0$ son constantes conocidas. La v.a. x_1 es observable, pero no x_2 .

- Un analista cree que x_2 equivale a un ruido impulsivo, y por ello decide estimar s mediante $\hat{s}_{ab}(x_1) = \arg \min_{\hat{s}} E\{|s - \hat{s}| | x_1\}$. Tras verificar que $\hat{s}_{ab}(x_1) = \text{med}\{s | x_1\}$, determínese la expresión analítica de dicho estimador.
- Un segundo analista no confía en que el valor conocido de b sea correcto, y por ello decide utilizar el estimador de máxima verosimilitud $\hat{s}_{ml}(x_1)$. Determínese su expresión analítica.
- Compárense los errores cuadráticos medios de los estimadores propuestos por ambos

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- i) Determínese $\hat{v}_{ml}(\{\mathbf{x}^{(k)}\})$.
- ii) Calcúlense la media y la varianza del estimador anterior.
- iii) ¿Es \hat{v}_{ml} absolutamente eficiente?
- iv) Si sólo se pueden observar las D' primeras variables, ¿cómo se modifican las respuestas de los apartados anteriores?

12.E19 La ddp

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2a^3}(x_1 + x_2) \exp\left(-\frac{x_1 + x_2}{a}\right) u(x_1)u(x_2)$$

gobierna el comportamiento de las vvaas x_1, x_2 .

Se dispone de K muestras de dichas variables, $\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\}$, muestras tomadas independientemente unas de otras.

- i) Determínese la expresión de $\hat{a}_{ml}(\{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}\})$.
- ii) Calcúlese $E\{\hat{a}_{ml}|a\}$ y $Var\{\hat{a}_{ml}|a\}$.
- iii) ¿Existe el estimador de a absolutamente eficiente?

12.E20 Un diseñador sabe que la va x que observa obedece a

$$p_A(s, x) = 1/a, \quad 0 < s < 2ax, \quad 0 < x < 1$$

$$p_B(s, x) = 1, \quad 0 < s < 2x, \quad 0 < x < 1$$

según probabilidades conocidas $P, 1 - P$, respectivamente, siendo $a > 1$ un parámetro determinista también conocido.

- i) El diseñador comienza por determinar los estimadores mmse de s a la vista de x para cada una de las situaciones posibles, $\hat{s}_{msA}(x)$ y $\hat{s}_{msB}(x)$. Determínense las expresiones de dichos estimadores y calcúlense sus errores cuadráticos medios, $E_A\{(s - s_A(x))^2\}$, $E_B\{(s - s_B(x))^2\}$.
- ii) Es inmediato apreciar que s, x , están gobernadas por la mezcla

$$p(s, x) = Pp_A(s, x) + (1 - P)p_B(s, x)$$

Calcúlese el error cuadrático medio dado x de un estimador cualquiera $\hat{s}(x)$, $E\{(s - \hat{s}(x))^2|x\}$.

- iii) El diseñador opta por elegir entre $\hat{s}_{msA}(x)$ y $\hat{s}_{msB}(x)$ según el valor mínimo de los errores cuadráticos condicionales correspondientes, calculados de acuerdo con ii). Explícitese la regla de selección que obtendrá el diseñador.
- iv) Tras calcular el estimador óptimo $\hat{s}_{msg}(x)$ para la mezcla presentada en ii) en su forma general (es decir, sin particularizar p_A y p_B), particularícese el resultado para la situación que se está considerando, y determínese $\hat{s}_{ms}(x)$ para el problema.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

respectivamente.

Un diseñador desea estimar s a partir de x , pero sólo tiene acceso a la verosimilitud $p(x|s)$; por ello, utiliza el estimador de máxima verosimilitud

$$\hat{s}_{ml}(x) = \arg \max_s p(x|s)$$

- i) Obténgase el estimador de error cuadrático medio mínimo, $\hat{s}_{ms}(x)$.
- ii) Obténgase $\hat{s}_{ml}(x)$, y compárese su expresión con la de $\hat{s}_{ms}(x)$.
- iii) Calcúlese el exceso de error cuadrático medio que implica el uso de $\hat{s}_{ml}(x)$ en lugar de $\hat{s}_{ms}(x)$.
- iv) ¿Cómo hay que modificar las expresiones anteriores si en lugar de tener acceso a x se observa una versión ruidosa $z = x + n$, siendo n independiente de x y s y con ddp $p(n) = G(n|0, v_n)$?

12.E23 La ddp conjunta de las vvaas s, x , es

$$p(s, x) = \begin{cases} 3/2, & 0 < s < 1 - x^2, \quad 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- i) Determínese $\hat{s}_{ms}(x)$.
- ii) Calcúlense el sesgo y la varianza del error de estimación $e_{ms}(x) = \hat{s}_{ms}(x) - s$, b_{ms} y v_{ms} , respectivamente.

Un diseñador maneja erróneamente

$$p_d(s, x) = \begin{cases} 2, & 0 < s < 1 - x, \quad 0 < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- iii) Determínese el estimador $\hat{s}_{dms}(x)$ que obtendrá el diseñador minimizando el error cuadrático medio a partir de $p_d(s, x)$.
- iv) Calcúlense la media y la varianza del error de estimación $e_{dms}(x) = \hat{s}_{dms}(x) - s$, b_{dms} y v_{dms} , respectivamente.

Un segundo diseñador también maneja $p_d(s, x)$ pero no está seguro de su validez, y opta por minimizar el error absoluto medio.

- v) Determínese el estimador $\hat{s}_{dma}(x)$ que obtendrá el segundo diseñador, y coméntese el resultado.

12.E24 Las vv.aa. s, x , están regidas por la ddp conjunta

$$p(s, x) = \begin{cases} 2a^2(sx)^{a-1}, & 0 < s < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- iv) Un analista obtiene el valor a' siguiendo el proceso del apartado anterior. Indíquese la expresión del estimador generalizado $\widehat{s}_{\text{gms}}(x)$ que resulta de utilizar dicho valor en lugar de a y calcúlese el valor cuadrático medio del error de estimación $e' = s - \widehat{s}_{\text{gms}}(x)$, y compruébese que es mayor que el de $e = s - \widehat{s}_{\text{ms}}(x)$.

12.E25 Las vvaas s, x , se rigen por la ddp conjunta

$$p(s, x) = \frac{a^2}{2} \exp[-a(|s - x| + |x|)]$$

con $a > 0$.

- Determinése $\widehat{s}_{\text{ms}}(x)$.
- Verifíquese que $E\{s - \widehat{s}_{\text{ms}}(x)\} = 0$, y establézcase el valor de $\text{Var}\{s - \widehat{s}_{\text{ms}}(x)\}$.
- Realícese el cambio de variables

$$y_1 = s - x$$

$$y_2 = x$$

e indíquese qué revela la ddp conjunta $p(y_1, y_2)$.

- Interprétese el resultado de i) a la vista de lo encontrado en iii).

12.E26 Sean s, x , dos vvaas con ddp conjunta

$$p(s, x) = \begin{cases} 3x, & 0 < s < x < 1 \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

- Determinése $\widehat{s}_{\text{ms}}(x)$ y el ecm asociado $E\{(s - \widehat{s}_{\text{ms}})^2\}$.
- En la implantación del estimador se producen un desajuste de nivel y la adición de un ruido n incorrelacionado con s, x , de media 0 y varianza v , de modo que se emplea $\tilde{s}_n(x) = \alpha \widehat{s}_{\text{ms}}(x) + n$. Calcúlese el ecm asociado a $\tilde{s}_n(x)$, $E\{(s - \tilde{s}_n(x))^2\}$.

12.E27 La ddp de Erlang de parámetro $m > 0$ y orden L (número natural) tiene la expresión

$$E(x|m, L) = \frac{x^{L-1}}{(L-1)!m^L} \exp(-x/m)u(x)$$

Es fácil comprobar que $E(x|m, L)$ es cerrada respecto a la convolución sobre el orden:

$$E(x|m, L_1) * E(x|m, L_2) = E(x|m, L_1 + L_2)$$

lo que, como se sabe, significa que la suma $x = x_1 + x_2$ de dos vvaas independientes es $E(x_1|m, L_1)$ y $E(x_2|m, L_2)$ es $E(x|m, L_1 + L_2)$.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

- iii) Un analista considera erróneamente que x es $E(x|m, L')$, y aplica la formulación anterior. Determinése el estimador que obtiene el analista, $\hat{m}_a(\{x^{(k)}\}_{k=1}^K)$, y el exceso de error cuadrático medio que ese estimador presenta con respecto a $\hat{m}_{ml}(\{x^{(k)}\}_{k=1}^K)$. Discútase el valor de dicho exceso.

12.A1 Que el estimador ML de un parámetro determinista resulte ser insesgado y absolutamente eficiente no significa que su error cuadrático medio sea mínimo, ya que puede existir un estimador sesgado que lo tenga menor: la eficiencia absoluta sólo implica varianza mínima para el sesgo que se está considerando.

- i) Considérese un estimador insesgado $\hat{s}(\mathbf{x})$ con varianza $\text{var}(s)$. Calcúlese el error cuadrático medio del estimador sesgado $\tilde{s}_a(\mathbf{x}) = a \hat{s}(\mathbf{x})$, siendo a una constante.
- ii) Determinése cuál es el valor de a que minimiza ese error cuadrático medio para un s dado.
Obviamente, este valor no tiene utilidad práctica, salvo que resulte independiente de s .
- iii) Considérese la estimación de la media s de una ddp exponencial unilateral

$$p(x|s) = \frac{1}{s} \exp\left(-\frac{x}{s}\right) u(x), \quad s > 0$$

Establézcase $\hat{s}_{ml}(\{x^{(k)}\})$, siendo $\{x^{(k)}\}$ K muestras de x tomadas de forma independiente.

- iv) Compruébese que $\hat{s}_{ml}(\{x^{(k)}\})$ es insesgado y absolutamente eficiente.
- v) Determinése el valor de a para el que $\tilde{s}_a(\{x^{(k)}\}) = a \hat{s}_{ml}(\{x^{(k)}\})$ tiene error cuadrático medio mínimo.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70