

BLOQUE I: PRELIMINARES

Tema 2

ALGUNAS NOCIONES DE TEORÍA DE CONJUNTOS, RELACIONES Y FUNCIONES

Lógica

Grado en Ingeniería Informática

Alessandra Gallinari

URJC

1

Contenido

Nociones de teoría de conjuntos

Inclusión e igualdad de conjuntos

Operaciones con conjuntos

Partes de un conjunto y propiedades de las operaciones con conjuntos

Cardinal de un conjunto

Relaciones binarias

Relaciones de equivalencia

Relaciones de orden

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Nociones de teoría de conjuntos

Este capítulo es un repaso de algunas nociones de teoría de conjuntos y de las definiciones básicas de relaciones y funciones.

En esta exposición presentaremos sólo aquellos conceptos indispensables para el estudio de la asignatura de Lógica Matemática.

3

Nociones de teoría de conjuntos

La lógica y la teoría de conjuntos están estrechamente relacionadas. De hecho en un principio se pensó que toda propiedad $P(x)$ (todo predicado, en el lenguaje de la lógica de primer orden) llevaba asociado un “conjunto”,

$$\{x : P(x)\}.$$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow shadow is cast beneath the text.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Nociones de teoría de conjuntos

Así, por ejemplo, sea nuestro universo de discurso “los seres humanos” y sea $P(x)$ la propiedad de un genérico ser humano x de medir al menos 1,70 metros de altura.

Dado un particular ser humano a , es posible determinar si la altura de a es al menos 1,70 metros, es decir, si a pertenece al conjunto $\{x : P(x)\}$.

5

Nociones de teoría de conjuntos

En 1903 Bertrand Russell propuso el siguiente ejemplo de “conjunto” (según la definición de conjunto de su época)

$$A = \{x : x \notin x\},$$

y preguntó si $A \in A$.

De la definición de A se sigue que $A \in A$ implica que $A \notin A$ y, además,

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Nociones de teoría de conjuntos

La primera de las restricciones es el *axioma de especificación*: una propiedad por sí sola no determina un conjunto, sino que selecciona elementos de un conjunto dado al que es necesario referirse.

Para no incurrir en contradicción con el axioma de especificación, es necesario asumir la no existencia del “conjunto universal U ,” el conjunto de todos los conjuntos. En efecto se puede demostrar que si U fuera un conjunto también $A = \{x \in U : x \notin x\}$ tendría que ser un conjunto. Así que la paradoja de Russell no se podría resolver.

7

Nociones de teoría de conjuntos

En respuesta a la paradoja de Russell, se propusieron varias formulaciones axiomáticas de la teoría de conjuntos. En nuestra exposición, utilizaremos reglas de construcción de conjuntos formuladas en términos de la lógica de predicados, a partir de los conceptos primitivos de conjunto y pertenencia (Zermelo-Fraenkel 1922).

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Nociones de teoría de conjuntos

Los conceptos de **conjunto** y de **pertenencia** de un elemento a un conjunto son conceptos *primitivos*, es decir, no se definen.

Diremos que un **conjunto** A es una colección (familia, clase), finita o infinita, de objetos de un universo U , tal que para todo objeto x se pueda determinar si x pertenece a A . Los objetos de un conjunto serán sus **elementos**. Si x pertenece al conjunto A , se escribirá $x \in A$. Si x no pertenece a A , se escribirá $x \notin A$.

Nociones de teoría de conjuntos

Ejemplos:

$\mathbb{N} := \{1, 2, \dots\}$ es el conjunto de los números naturales,

$\mathbb{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ es el conjunto de los números enteros,

$\mathbb{F} := \{\frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z} \text{ y } q \neq 0\}$ es el conjunto de las fracciones de números enteros,

$A := \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$ es el conjunto solución de la ecuación

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Inclusión e igualdad de conjuntos

- ▶ **Inclusión:** Si todo elemento x de un conjunto A es también elemento de un conjunto B , se dirá que A está contenido en B o que A es un **subconjunto** de B (y se escribirá $A \subseteq B$ ó $B \supseteq A$).
- ▶ **Inclusión propia:** Si A es un subconjunto de B y existe un elemento de B que no pertenece a A , entonces A es un **subconjunto propio** de B : $A \subsetneq B$ ó $A \subset B$.
- ▶ **Igualdad:** Dos conjuntos A y B son **iguales** si contienen los mismos elementos. Por ejemplo, los conjuntos $A = \{-2, 1, 0, -7\}$ y $B = \{-7, 1, 0, -2\}$ son iguales.

11

Inclusión e igualdad de conjuntos

Nota importante: para demostrar que dos conjuntos A y B son iguales, es necesario verificar las dos siguientes condiciones:

$$1) A \subseteq B \quad (1)$$

$$2) B \subseteq A \quad (2)$$

Ejemplos: 1) Sean $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + x - 2 = 0\}$ y $B = \{-2, 1\}$.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Inclusión e igualdad de conjuntos

- ▶ **Conjunto vacío:** El **conjunto vacío** \emptyset es el conjunto que no tiene elementos.

Nota: el conjunto \emptyset **no es igual** al conjunto $A = \{\emptyset\}$, pues A tiene un elemento, el conjunto vacío.

Ejemplo: Sea $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = -1\}$. Entonces $A = \emptyset$.

13

Inclusión e igualdad de conjuntos

Proposición Sea A un conjunto cualquiera. Entonces $\emptyset \subseteq A$.
La justificación de esta proposición es inmediata, ya que (como estudiaremos muy pronto) toda deducción con una premisa falsa es verdadera.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Operaciones con conjuntos

Si A y B son dos conjuntos, es posible construir nuevos conjuntos por medio de las siguientes operaciones:

- ▶ la **unión** de A y B es el conjunto $A \cup B$ de todos los elementos de A o de B , es decir

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ó } x \in B\},$$

15

Operaciones con conjuntos

- ▶ la **intersección** de A y B es el conjunto $A \cap B$ de todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B , es decir

$$A \cap B = \{x : (x \in A) \text{ y } (x \in B)\}.$$

Si A y B no tienen elementos en común, entonces $A \cap B = \emptyset$ y se

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Operaciones con conjuntos

- ▶ el **complemento (relativo) de B respecto de A** es el conjunto $A \setminus B$ de todos los elementos de A que no pertenecen a B , es decir

$$A \setminus B = \{x : (x \in A) \text{ y } (x \notin B)\}.$$

17

Operaciones con conjuntos

- ▶ el **producto cartesiano** de dos conjuntos *no vacíos* A y B es el conjunto de todos pares *ordenados* (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$, es decir

$$A \times B = \{(a, b) : (a \in A) \text{ y } (b \in B)\}.$$

Para representar gráficamente un producto cartesiano $A \times B$ de dos conjuntos, se puede utilizar un sistema de ejes. Los elementos de A se


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Operaciones con conjuntos

Por ejemplo, sean $A = \{x, y, z\}$ y $B = \{a, b\}$. La siguiente figura es una representación gráfica (obtenida con el sistema Maple sustituyendo las letras por números: $x = 1, y = 2, z = 3, a = 1, b = 2$) de $A \times B$.



19

Partes de un conjunto

Si A es un conjunto, se llama **conjunto de las partes de A** , $P(A)$, al nuevo conjunto cuyos elementos son exactamente los subconjuntos de A .

Nota: Para todo conjunto A , $P(A)$ es siempre no vacío, ya que $\emptyset \in P(A)$.

Ejemplo: Sea $A = \{a, b, c\}$. Entonces

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Propiedades de las operaciones con conjuntos

Sean A, B y C tres conjuntos. Las principales propiedades de las operaciones con conjuntos son las siguientes:

1) **idempotencia** de la unión y de la intersección:

$$A \cup A = A \quad (3)$$

$$A \cap A = A \quad (4)$$

21

Propiedades de las operaciones con conjuntos

2) **conmutatividad** de la unión y de la intersección:

$$A \cup B = B \cup A \quad (5)$$

$$A \cap B = B \cap A \quad (6)$$

3) **asociatividad** de la unión y de la intersección:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

Propiedades de las operaciones con conjuntos

4) **distributividad** de la unión respecto de la intersección y de la intersección respecto de la unión:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (9)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (10)$$

5)

$$A \cup \emptyset = A \quad (11)$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset \quad (12)$$

23

Propiedades de las operaciones con conjuntos

6) **Leyes de De Morgan** (para conjuntos):

$$C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B) \quad (13)$$

$$C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B) \quad (14)$$

7)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Unión e intersección de una familia arbitraria de conjuntos

Las definiciones de unión y de intersección de dos conjuntos se pueden extender a una familia arbitraria de conjuntos. Si J es un conjunto fijado y asociamos a cada $j \in J$ un conjunto A_j , entonces obtenemos la familia de conjuntos $\{A_j\}_{j \in J}$.

La unión de los conjuntos de la familia $\{A_j\}_{j \in J}$ es el nuevo conjunto

$$A = \bigcup_{j \in J} A_j$$

tal que x es un elemento de A si x es un elemento de al menos uno de los conjuntos de la familia $\{A_j\}_{j \in J}$.

25

Unión e intersección de una familia arbitraria de conjuntos

La intersección de los conjuntos de la familia $\{A_j\}_{j \in J}$ es el nuevo conjunto

$$A = \bigcap_{j \in J} A_j$$

tal que x es un elemento de A si x es un elemento de todos los conjuntos

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Unión e intersección de una familia arbitraria de conjuntos

Ejemplo: Si $J = \mathbb{N}$ y $\forall n \in \mathbb{N}$ definimos $\mathbb{N}_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, entonces $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{N}_n = \mathbb{N}$ y $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{N}_n = \{1\}$.

27

Cardinal de un conjunto

El **cardinal** de un conjunto finito A , $Card(A)$, es el número de elementos de A . Si A es un conjunto infinito se escribirá $Card(A) = \infty$.

Cardinal de la unión: Sean A y B dos conjuntos finitos cualesquiera, entonces

$$Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B) - Card(A \cap B) \leq$$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cardinal de un conjunto

Observación: Se puede comprobar que si A es un conjunto finito con $Card(A) = n$, entonces $Card(P(A)) = 2^n$.

Ejemplos: 1) $Card(\mathbb{N}) = \infty$

2) Sean $A = \{-2, 0, 3, 17\}$ y $B = \{-7, 0, 5, 17, 18\}$. Entonces, $A \cup B = \{-7, -2, 0, 3, 5, 17, 18\}$ y $A \cap B = \{0, 17\}$. Luego, se verifica que

$$7 = Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B) - Card(A \cap B) = 4 + 5 - 2.$$

29

Relaciones binarias

Definición: Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Una **relación binaria** entre A y B es un subconjunto R del producto cartesiano $A \times B$. Si $(a, b) \in R$ se dirá que a y b están relacionados y se escribirá aRb .


The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Relaciones binarias

Ejemplo: Sean $A = \{a, b, c\}$, $B = \{d, e\}$ y $R = \{(a, d), (b, e), (c, d), (c, e)\}$. Entonces aRd , bRe , cRd y cRe .



31

Relaciones binarias

Si $R \subseteq A \times A$ (es decir, si $A = B$), se dirá que R es una **relación binaria en A**.

En las siguientes definiciones vamos a emplear el cuantificador universal \forall y el símbolo de implicación \rightarrow de la lógica de predicados, que estudiaremos en detalle. La notación $\forall x \in A$ quiere interpretarse como

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Relaciones binarias

Una relación R en un conjunto no vacío A puede ser:

- ▶ R1) **reflexiva:** $\forall x \in A \quad xRx$
- ▶ R2) **simétrica:** $\forall x, y \in A \quad xRy \rightarrow yRx$
- ▶ R3) **antisimétrica:** $\forall x, y \in A \quad (xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y$
- ▶ R4) **transitiva:** $\forall x, y, z \in A \quad (xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz$

33

Relaciones binarias

Para estudiar las propiedades de una relación binaria sobre un conjunto A es conveniente representar gráficamente la relación (ver ejercicio 6).

Observación: Las únicas relaciones binarias en un conjunto no vacío A que sean al mismo tiempo simétricas y antisimétricas son tales que

$$R \subset \{(x, y) : x = y\}$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Relaciones binarias

- Ejemplos:** 1) Sea A el conjunto de las personas y $R = \{(a, b) \in A \times A : a \text{ es el padre de } b\}$. Esta relación no tiene ninguna de las propiedades $R1$, $R2$ y $R4$.
- 2) En el conjunto de las partes $P(A)$ de un conjunto A , la relación de inclusión $R = \{(B, C) \in P(A) \times P(A) : B \subseteq C\}$ es reflexiva, antisimétrica y transitiva.
- 3) En el conjunto \mathbb{Z} de los números enteros, la relación $R = \{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : n - m \text{ es par}\}$ es reflexiva, simétrica y transitiva.

35

Relaciones binarias

- 4) En el conjunto de las rectas del plano real, la relación “ r es ortogonal a s ” no es reflexiva, es simétrica y no es transitiva.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Definición: Si $R \subseteq A \times B$ es una relación binaria, se denomina

- ▶ **dominio** de R al conjunto

$$\text{dom}(R) = \{x \in A : \exists y \in B \text{ tal que } (x, y) \in R\} \subseteq A$$

- ▶ **imagen directa (o rango)** de R al conjunto

$$\text{Im}(R) = \{y \in B : \exists x \in A \text{ tal que } (x, y) \in R\} \subseteq B$$

37

Relaciones binarias

- ▶ **imagen inversa (o recíproca)** de un subconjunto C de B al conjunto

$$R^{-1}(C) = \{x \in A : \exists y \in C \text{ tal que } (x, y) \in R\} \subseteq A$$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Relaciones de equivalencia

Definición: Una relación binaria R en un conjunto no vacío A se denomina **relación de equivalencia** si es reflexiva, simétrica y transitiva. Si R es una relación de equivalencia en A y $a, b \in A$ son tales que aRb , se escribirá $a \sim b$.

Si $a \in A$ y \sim es una relación de equivalencia en A , se puede definir un subconjunto $C(a)$ de A denominado **clase de equivalencia de a** :

$$C(a) = \{x \in A : x \sim a\}. \quad (18)$$

Notar que $C(a)$ no es vacío ya que toda relación de equivalencia es reflexiva.

39

Relaciones de equivalencia

Sea b otro elemento de A . Puede ocurrir sólo una de las siguientes situaciones:

$$\text{si } a \sim b, \text{ entonces } C(a) = C(b), \quad (19)$$

$$\text{si } a \not\sim b, \text{ entonces } C(a) \cap C(b) = \emptyset. \quad (20)$$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Relaciones de equivalencia

Por tanto, si consideramos el conjunto de las *distintas* clases de equivalencias, este conjunto representa una *partición* de todo A entre subconjuntos disjuntos y se denomina *conjunto cociente*.

41

Relaciones de equivalencia

Ejemplos: 1) La relación $R = \{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : n - m \text{ es par}\}$, es una relación de equivalencia y $\mathbb{Z} = C(0) \cup C(1)$. $C(0)$ es el conjunto de todos los enteros pares y $C(1)$ de los enteros impares.

2) En el conjunto de las rectas del plano real, la relación “ r es paralela a s ” es una relación de equivalencia. Para toda recta r , $C(r)$ representa a

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Relaciones de equivalencia

3) Números racionales

En el conjunto \mathbb{F} de las fracciones $\mathbb{F} := \{p/q : p, q \in \mathbb{Z} \text{ y } q \neq 0\}$, para todo par de fracciones $r_1 = \frac{p_1}{q_1}$ y $r_2 = \frac{p_2}{q_2}$, se define la relación de equivalencia R como $r_1 \sim r_2 \leftrightarrow p_1q_2 = p_2q_1$. El conjunto de las clases de equivalencia es el conjunto \mathbb{Q} de los números racionales.

43

Relaciones de orden

Definición: Una relación R en un conjunto (no vacío) A es una **relación de orden** si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Si R es una relación de orden en A y $x, y \in A$ son tales que xRy , se escribirá $x \leq y$.

Una relación de orden R sobre A tal que cada dos elementos x e y de A se pueden comparar (es decir, $\forall x, y \in A, xRy$ ó yRx) es una **relación de**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

Relaciones de orden

Ejemplos: 1) En el conjunto de los números reales la relación “menor o igual que” (\leq) es una relación de orden total. En particular, sea $A := \{1, 2, 3, 4, 12\}$. El orden del conjunto A dado por \leq se puede representar con un grafo orientado:

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow 12$$

2) En el conjunto de las partes de un conjunto A , la relación de inclusión (\subseteq) es una relación de orden parcial.

45

Relaciones de orden

3) En el conjunto de los números naturales la relación “ser divisor de”, $|$, es una relación de orden parcial. En particular, para el mismo conjunto $A := \{1, 2, 3, 4, 12\}$ del ejemplo 1), la relación $|$ se puede representar por medio del siguiente grafo:

3

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white starburst shape behind the text.

Relaciones de orden

A toda relación de orden “ \leq ” en A se le puede asociar una **relación de orden estricto**, definida por

$$\forall x, y \in A, \quad x < y \quad \leftrightarrow \quad x \leq y \quad y \quad x \neq y. \quad (21)$$

La relación $<$ es tal que

- i) no existen elementos $x, y \in A$ tales que $x < y$ e $y < x$ simultáneamente,
- ii) es transitiva.

47

Relaciones de orden

Viceversa, a partir de una relación R en A que cumple las condiciones i) y ii), se puede definir la relación de orden

$$x \leq y \leftrightarrow ((x < y)(x = y)).$$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white starburst effect behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Relaciones de orden

Son muy importantes las **relaciones de orden estricto y total**, es decir, las relaciones que satisfacen las siguientes dos propiedades:

- ▶ **transitiva:** $\forall x, y, z \in A, (x < y \text{ e } y < z) \rightarrow x < z.$
- ▶ **de tricotomía:** $\forall x, y \in A,$ se cumple exactamente una de las siguientes afirmaciones:

$$x = y, \quad x < y, \quad y < x.$$

49

Relaciones de orden

Ejemplos:

- 1) En el conjunto de los números reales la relación “menor que” es una relación de orden estricto y total.
- 2) En el conjunto de las partes de un conjunto A , la relación de inclusión propia (es decir, $\forall B, C \in P(A), B < C$ si $B \subseteq C$ y $B \neq C$) es una

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Mínimos y máximos de un conjunto

Definición:

Si \leq es una relación de orden en un conjunto A y $B \subseteq A$, un elemento $m \in B$ es **un mínimo** de B si $\forall x \in B \quad m \leq x$. Un elemento $M \in B$ es **un máximo** de B si $\forall x \in B \quad x \leq M$.

Se puede comprobar fácilmente que el mínimo y el máximo de un conjunto existen, entonces son únicos.

51

Mínimos y máximos de un conjunto

Ejemplos: 1) \emptyset es el mínimo y A el máximo del conjunto de las partes $P(A)$ del conjunto A , ordenado con la inclusión.

2) -1 es el mínimo y 4 es el máximo del intervalo (cerrado) $[-1, 4] \subseteq \mathbb{R}$, donde \mathbb{R} tiene el orden "menor o igual que."

3) En el conjunto de los números naturales ordenados por "ser divisor

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Relaciones n -arias

Definición: Sean A_1, A_2, \dots, A_n conjuntos no vacíos. Una **relación de aridad n o n -aria** es un subconjunto R del producto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$. Si $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in R$ se dirá que (a_1, a_2, \dots, a_n) están relacionados.

Ejemplo: Sean $A_1 = \{a, b, c\}$, $A_2 = \{d, e\}$ y $A_3 = \{1, 2\}$.
 $R = \{(a, d, 1), (b, e, 1), (c, d, 2), (c, e, 2)\}$ es una relación ternaria sobre $A_1 \times A_2 \times A_3$.

Funciones

Una función (o aplicación) $(n + 1)$ -aria, $f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \longrightarrow B$, de un conjunto no vacío $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ a un conjunto no vacío B se puede definir como “una regla de correspondencia que asigna a cada elemento $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A$ un único elemento $b = f(a_1, a_2, \dots, a_n) \in B$.”

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Funciones

La siguiente definición es más general e identifica el concepto de función con una clase particular de relaciones binarias.

Definición: Sean A_1, A_2, \dots, A_n y B conjuntos no vacíos. Una **función (o aplicación) $(n + 1)$ -aria** $f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \longrightarrow B$ es una relación $(n + 1)$ -aria $f \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times B$ tal que

f1) $dom(f) = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$,

f2) si $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in dom(f)$ existe un **único** $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \in B$ tal que $(a_1, a_2, \dots, a_n, f(a_1, a_2, \dots, a_n)) \in f$.

55

Funciones

Entonces una función $f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \longrightarrow B$ es una relación entre $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ y B tal que a cada elemento de $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ corresponde un único elemento $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ del codominio B .

Si $(a_1, a_2, \dots, a_n, f(a_1, a_2, \dots, a_n)) \in f$, se dirá que $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ es la **imagen de** (a_1, a_2, \dots, a_n) por la función f o el **valor de** f en

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Funciones

Test de la recta vertical: Una relación $R \subseteq A \times B$ es una función si y sólo si

- 1) $dom(R) = A$ y
- 2) su gráfica corta a cada “recta vertical” en un punto a lo más.

57

Funciones

Ejemplos: 1) La relación binaria definida por: $A = \{a, b, c\}$, $B = \{d, e\}$ y $R = \{(a, d), (b, e), (c, d), (c, e)\}$ no es una función.

2) La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$, es tal que $dom(f) = \mathbb{R}$ y $Im(f) = \mathbb{R}$.

3) La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^2$, es tal que $dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} (= [0, \infty))$. En este caso, $f^{-1}([0, 2]) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ y $f^{-1}((-2, 0]) = \{0\}$.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Definición: Dos funciones $f, g \subseteq A \times B$ son **iguales** si y sólo si:

a) $dom(f) = dom(g)$

b) $\forall x \in dom(f), f(x) = g(x)$.

Ejemplo: Las funciones $f(x) = x^2, \forall x \in \mathbb{R}$ y $g(x) = x^2, \forall x > 0$ no son iguales, ya que $dom(f) \neq dom(g)$.

Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Definición: Una función $f : A \rightarrow B$ es

- ▶ **inyectiva:** si $\forall x, y \in A,$
 $x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y)$ o, equivalentemente,
 $f(x) = f(y) \rightarrow x = y.$

A elementos distintos x e y de A corresponden elementos distintos $f(x)$ y $f(y)$ de B .

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

- ▶ **biyectiva:** si es inyectiva y sobreyectiva.

Por tanto, una función $f : A \rightarrow B$ es biyectiva si

$$\forall b \in B \exists!(\text{existe un \u00fanico}) a \in A \text{ tal que } f(a) = b.$$

Test de la recta horizontal: Una funci\u00f3n f es inyectiva si y s\u00f3lo si cada “recta horizontal” corta la gr\u00e1fica de f en un punto a lo m\u00e1s.

61

Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Ejemplos: 1) La funci\u00f3n $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$, es biyectiva.

2) La funci\u00f3n $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^2$, no es ni inyectiva, ni sobreyectiva.

3) La funci\u00f3n $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ definida por $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$, es biyectiva.

4) La funci\u00f3n **proyecci\u00f3n** sobre A , $p : A \times B \rightarrow A$, definida por

CLASES PARTICULARES, TUTOR\u00cdAS T\u00c9CNICAS ONLINE
LLAMA O ENV\u00cdA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Composición de funciones

Definición: Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ dos funciones.
La función **composición (o compuesta)** de f y g es la función $g \circ f : A \rightarrow C$ definida por $\forall a \in A, (g \circ f)(a) = g(f(a))$.
Entonces

$$g \circ f = \{(a, g(f(a))) : a \in A\} \subseteq A \times C.$$

63

Composición de funciones

Ejemplos:

a) Siendo \mathbb{R}^+ el conjunto de los números reales positivos, sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ la función $f(x) = x^2 + 1$ y sea $g : \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ la función $g(x) = \sqrt{x}$.
Entonces, la función $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ es la función

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Composición de funciones

b) Sean D el conjunto de las personas, M el subconjunto de las madres y A el subconjunto de las abuelas.

Definimos las funciones $f : D \rightarrow M$ y $g : M \rightarrow A$ que asocian a toda persona y a toda madre, respectivamente, su propia madre.

En este caso la función $g \circ f : D \rightarrow A$ resulta ser la función que asocia a toda persona su abuela materna.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow arrow pointing to the left, both partially obscured by the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70