

Definición de topología. Ejemplos de topologías.

- 1) Sean $X = \{a, b, c\}$ un conjunto con tres elementos. Encontrar todas las topologías sobre X .
- 2) En \mathbb{R} se considera $\mathcal{T} = \{(-\infty, a) : -\infty \leq a \leq \infty\}$. Demostrar que es una topología.
- 3) Sean X un conjunto infinito y \mathcal{T} una topología sobre X en la que todos los subconjuntos infinitos son abiertos. Demostrar que \mathcal{T} es la topología discreta de X .
- 4) Sea X un conjunto con más de dos elementos.
 - a) Definir dos topologías $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ sobre X de modo que $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ no sea una topología.
 - b) Sea $\mathcal{T}_j, j \in J$ una familia de topologías sobre X . Probar que $\bigcap_{j \in J} \mathcal{T}_j$ es también una topología sobre X .
- 5) En el plano \mathbb{R}^2 se considera la familia \mathcal{T} de todos los subconjuntos U tales que para cada punto (a, b) de U existe un $\varepsilon > 0$ de forma que $((a - \varepsilon, a + \varepsilon) \times \{b\}) \cup (\{a\} \times (b - \varepsilon, b + \varepsilon)) \subset U$. Estudiar si \mathcal{T} es una topología en \mathbb{R}^2 .
- 6) Sea $g : X \rightarrow Y$ una aplicación entre dos conjuntos.
 - a) Demostrar que si \mathcal{T} es una topología en X entonces $\mathcal{S} := \{E \subset Y : g^{-1}(E) \in \mathcal{T}\}$ es una topología en Y .
 - b) Demostrar que si \mathcal{S} es una topología en Y entonces $\mathcal{U} := \{g^{-1}(E) : E \in \mathcal{S}\}$ es una topología en X .
- 7) Sean X un conjunto y a un elemento de X . Se considera la familia \mathcal{T}_a de los subconjuntos U de X tales que o bien U es vacío, o bien $a \in U$. Estudiar si \mathcal{T}_a es una topología en X .

Bases y entornos.

- 8) Decidir, a partir de las definiciones básicas, si los siguientes conjuntos son abiertos y/o cerrados (o ninguna de las dos cosas):
 - a) $X = [0, 1] \times [0, 1]$, $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\text{lex}}$, la topología del orden lexicográfico, y los conjuntos: $\{a\} \times [0, 1]$, $\{a\} \times (0, 1]$, $\{a\} \times [0, 1)$, $\{a\} \times (0, 1)$, $[0, 1] \times \{a\}$, $(0, 1] \times \{a\}$, $[0, 1) \times \{a\}$, $(0, 1) \times \{a\}$, $(0, a) \times [0, 1]$, $[0, a] \times [0, 1]$, con $0 \leq a \leq 1$.
 - b) $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{[\cdot, \cdot)}$ y los conjuntos: $[0, 1]$, $[0, 1)$, $(0, 1]$, $(0, 1)$, $\{\frac{1}{n} : n = 1, 2, \dots\}$, $\{-\frac{1}{n} : n = 1, 2, \dots\}$.
- 9) Se consideran las siguientes familias de subconjuntos de \mathbb{R} .

$$\mathcal{B}_{\leftarrow} = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}_{\rightarrow} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$$

- a) Demostrar que cada familia es una base de una topología sobre \mathbb{R} .
 - b) Comparar esas topologías.
 - c) Demostrar que la topología generada por $\mathcal{B}_{\leftarrow} \cup \mathcal{B}_{\rightarrow}$ es la usual.
- 10) Probar que si \mathcal{B} es una base para una topología sobre X , entonces la topología $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ generada por

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

Espacios métricos

13) Sea (X, d) un espacio métrico. Demostrar que, para cualesquiera x, y, x' e y' elementos de X , se cumple

$$|d(x, y) - d(x', y')| \leq d(x, x') + d(y, y')$$

Deducir de ello que $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = d(x, y)$ cuando $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y)$.

14) Estudiar si (\mathbb{R}, d) es un espacio métrico, donde $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está definida como

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ |x| + |y| & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

Dibujar la bola $\mathbb{B}(x, r)$ para los casos

a) $x = 0$ y radio $r = 1/2$

b) $x = 1/2$ y $r = 1$.

15) Demostrar que si d es una distancia entonces $d'(x, y) = \min(d(x, y), 1)$ también lo es y que ambas distancias inducen la misma topología.

16) Demostrar que $d(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$ es una distancia en \mathbb{R} .

Ayuda: demostrar primero que la función $f(z) = \frac{z}{1+z}$ es creciente y subaditiva en el intervalo $[0, \infty)$. Esto último quiere decir que $f(a + b) \leq f(a) + f(b)$ si $a, b \geq 0$.

17) Comprobar que los siguientes espacios de sucesiones con las distancias mencionadas son espacios métricos:

a) Sea \mathbb{R}^ω el espacio de todas las sucesiones de números reales $x = (x_n)$. Se define $d : \mathbb{R}^\omega \times \mathbb{R}^\omega \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$d(x, y) = \sum_n \frac{|x_n - y_n|}{2^n(1 + |x_n - y_n|)} \text{ para } x \in \mathbb{R}^\omega, y \in \mathbb{R}^\omega$$

¿Cuál es la distancia entre las sucesiones $x = (x_n) = ((1 - 2^{-n})^{-1})$ e $y = (y_n) = (1)$?

b) Sean ℓ_∞ el espacio de todas las sucesiones acotadas y $d : \ell_\infty \times \ell_\infty \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$d(x, y) = \sup \{|x_n - y_n| : n \in \mathbb{N}\}$$

c) Sean ℓ_2 el espacio de todas las sucesiones $x = (x_n)$ tales que $\sum_n x_n^2 < \infty$ y $d : \ell_2 \times \ell_2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$d(x, y) = \left(\sum_n |x_n - y_n|^2 \right)^{1/2}$$

Indicación: si $x = (x_n) \in \ell_2, y = (y_n) \in \ell_2$, entonces $\sum |x_n y_n|$ converge y $(\sum |x_n y_n|)^2 \leq (\sum x_n^2)(\sum y_n^2)$.

18) En \mathbb{R}^n se define

$$d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n|.$$

Demostrar que d_1 es una distancia en \mathbb{R}^n y que induce la topología usual de \mathbb{R}^n



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70