

Ejercicios del tema 2

1.- Estudia si el conjunto $M = \left\{ \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{pmatrix} : a_{i,j} \in \mathbf{R} \right\}$ de matrices en \mathbf{R} respecto de la suma de matrices y del producto por escalares es un espacio vectorial sobre \mathbf{R} .

2.- Estudia si el conjunto $S = \{\{x_n\}_0^\infty : x_n \in \mathbf{R}\}$ de sucesiones en \mathbf{R} respecto de las operaciones

$$\begin{aligned} \{x_n\} + \{y_n\} &= \{x_n + y_n\} \\ \alpha\{x_n\} &= \{\alpha x_n\} \end{aligned}$$

es un espacio vectorial sobre \mathbf{R} .

3.- Calcula el valor de a y b para que el vector $\vec{v} = (a, -2, 1, b)$ se pueda expresar como combinación lineal de los vectores $\vec{u}_1 = (1, 2, 3, 4)$ y $\vec{u}_2 = (-1, 0, -2, 3)$.

4.- Siendo $\vec{u}_1 = (-5, 2, 8, -16)$, $\vec{u}_2 = (-5, 3, 17, -14)$ y $\vec{u}_3 = (1, 1, 11, 6)$, expresa \vec{u}_1 como combinación lineal de \vec{u}_2 y \vec{u}_3 .

5.- Sea $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ un conjunto de vectores de \mathbf{R}^3 tal que $\vec{u}_1 = (1, 2, 3)$, $\vec{u}_2 = (2, 1, 0)$ y $\vec{u}_3 = (-1, -1, 0)$. Demuestra que estos vectores forman una base de \mathbf{R}^3 y calcula las coordenadas del vector $(1, -1, 0)$ respecto de esta base.

6.- Determina cuáles de los conjuntos siguientes de vectores son linealmente independientes, cuáles generan el espacio y cuáles forman una base del espacio:

En \mathbf{R}^2 :

- (a) $\{(4/5, 5/4), (4, 5)\}$,
- (b) $\{(1, 2), (11, -7\sqrt{2}), (-1, 1)\}$.

En \mathbf{R}^3 :

- (c) $\{(1, -1, -\sqrt{5}), (1, 1, \sqrt{5}), (0, 1, 2\sqrt{5})\}$,
- (d) $\{(1, 0, 0), (1, 1, 1), (0, 1, 2), (-1, -2, -3)\}$.

En \mathbf{R}^4 :

- (e) $\{(1, 1, 1, 1), (1, -1, -1, 1), (1, -1, 1, -1), (1, 1, -1, -1)\}$,
- (f) $\{(1, 1, 2, 4), (2, -1, -5, 2), (1, -1, -4, 0), (2, 1, 1, 6)\}$.

7.- Encuentra, si es posible, una base de \mathbf{R}^3 contenida en el conjunto $\{(1, 0, 2), (0, 1, 1), (2, 1, 5), (1, 1, 3), (1, 2, 1)\}$.

8.- Encuentra, si es posible, una base de \mathbf{R}^4 que contenga al conjunto $\{(1, 2, 3, 4), (1, -2, 3, 1)\}$.

9.- Determina todos los valores de α para los que $L((1, 1, 0), (-1, 0, -1), (0, 1, \alpha))$ es igual a \mathbf{R}^3 .

10.- Sea λ un elemento de \mathbf{R} . Halla los valores de λ para los que el conjunto $\{(\lambda, 1 - \lambda, 0), (0, \lambda, 1 - \lambda), (1 - \lambda, 0, \lambda)\}$ de \mathbf{R}^3 es linealmente independiente.

11.- En un espacio vectorial V sobre \mathbf{R} de dimensión 3, demuestra que si los vectores $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ forman una base, también es una base la formada por los vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$, siendo

$$\vec{v}_1 = \vec{u}_1 + 2\vec{u}_2, \quad \vec{v}_2 = 2\vec{u}_1 - \vec{u}_2, \quad \vec{v}_3 = \vec{u}_3$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

(5) $\mathcal{D}_3 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x \geq 0\}$.

14.- Determina cuánto deben valer a y b para que el vector $\vec{v} = (a, 1, b, -5)$ pertenezca al subespacio vectorial engendrado por los vectores $\vec{u}_1 = (2, 1, 0, 4)$ y $\vec{u}_2 = (-1, 1, -1, 1)$.

15.- Halla la dimensión y una base de cada uno de los subespacios de \mathbf{R}^5 generados por los siguientes subconjuntos de vectores:

$$A = \{(1, 1, 1, -1, -1), (2, 0, 2, 0, 1), (3, 1, 3, -1, 0), (5, 1, 5, -1, 1)\},$$

$$B = \{(6, 3, 9, 3, 3), (8, 4, 12, 4, 4), (10, 5, 15, 5, 5)\},$$

$$C = \{(1, 2, 3, 4, 5), (2, 2, 2, 2, 2), (-5, -4, -3, -2, -1), (6, 7, 8, 9, 10)\}.$$

16.- Consideramos el subconjunto W de \mathbf{R}^4 formado por los elementos (w, x, y, z) que verifican

$$w + x + y + z = 0 \quad w - x + y - z = 0,$$

- (1) Demuestra que W es un subespacio vectorial de dimensión 2 de \mathbf{R}^4 .
- (2) Estudia si el vector $\vec{u} = (4, 1, -4, -1)$ pertenece a W .
- (3) Estudia si los vectores $\vec{u}_1 = (2, 1, -2, -1)$ y $\vec{u}_2 = (1, 0, -1, 0)$ forman una base de W .
- (4) En caso de que las respuestas a (2) y (3) sean afirmativas, halla las coordenadas de \vec{u} respecto de $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$.

17.- En \mathbf{R}^3 se considera el conjunto de los vectores (x, y, z) definido por

$$S = \{(x, y, z) : 2x - y + z = 0 \text{ y } x + y + z = 0\}.$$

Demuestra que S es un subespacio de \mathbf{R}^3 de dimensión 1 y halla una base del mismo.

18.- En \mathbf{R}^4 se consideran los subespacios

$$S = \{(x, y, z, t) : x + y + z = 0, z + t = 0\} \quad \text{y}$$

$$S' = \{(\lambda + \mu, \lambda + 2\mu, \lambda + 3\mu, \lambda + \mu), \lambda, \mu \in \mathbf{R}\}.$$

Halla bases de $S \cap S'$ y de $S + S'$.

19.- En \mathbf{R}^3 se consideran los subespacios

$$U = L\{(1, 1, 1), (1, 2, 0), (3, 5, 1)\} \quad \text{y}$$

$$W = \{(x, y, z) : x = 0, y + z = 0\}.$$

Halla bases de $U \cap W$ y de $U + W$.

20.- Halla un subespacio suplementario del subespacio vectorial de \mathbf{R}^4 de ecuación implícita $x + y + z + t = 0$.

21.- Consideramos los subespacios vectoriales $W = L((1, 2, -1))$ y $W' = L((1, 1, 0), (1, 0, -1))$ de \mathbf{R}^3 .

- (1) Demuestra que W' es un subespacio suplementario de W .
- (2) Encuentra otro subespacio W'' suplementario de W .

22.- Halla las ecuaciones del cambio de base:

- (1) De la base $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ a la base $B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$, sabiendo que

$$\vec{u}_1 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \quad \vec{u}_2 = \vec{v}_2 + \vec{v}_3, \quad \vec{u}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_3.$$

- (2) De la base B' a la base B .
- (3) Las coordenadas del vector $\vec{w} = \vec{u}_1 + 3\vec{u}_3$ respecto de B' y las de $\vec{x} = 5\vec{v}_1 + 3\vec{v}_2 + \vec{v}_3$ respecto de B .

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99