

- 1) Decir cuáles de las siguientes condiciones son *necesarias*, cuáles son *suficientes* y cuáles son *necesarias y suficientes* para que un número **natural**  $n$  sea divisible por 6.
- (a)  $n$  es divisible por 3;                      (c)  $n = 24$ ;                                      (e)  $n$  es par y divisible por 3;  
 (b)  $n$  es divisible por 12;                      (d)  $n^2$  es divisible por 6;                                      (f)  $n$  es par o divisible por 3.

¿Es posible colocar las seis en este esquema, de modo que todas las implicaciones sean ciertas?

$$(\ ) \Rightarrow (\ ) \Rightarrow (\ ) \Leftrightarrow (\ ) \Rightarrow (\ ) \Rightarrow (\ )$$

¿Puede hacerse eso de más de una manera? ¿Se cumple alguna otra implicación?

- 2) En las siguientes proposiciones,  $x, y$  son números **reales**. Traduce cada una a frases que no contengan ningún símbolo, sólo palabras. Explica cuáles son ciertas y escribe la negación de las que no lo sean.

- (a)  $\forall x (x > 0 \Rightarrow \exists y : (y > 0) \wedge (y^2 = x))$                                       (c)  $\exists x : (1 < x^2) \wedge (x^2 < x)$   
 (b)  $\exists x : \forall y ((y < x) \vee (y > 5))$                                       (d)  $\forall y \exists x : (x \in \mathbb{R}) \wedge (x^3 = y + 1)$

- 3) Traduce cada una de las siguientes afirmaciones a sentencias que usen símbolos y cuantificadores, y no contengan palabras.

- (a) *No siempre hay un número entero entre la raíz cuadrada de  $n$  y la de  $n + 4$ .*  
 (b) *Todo número real positivo tiene dos raíces cuartas reales y distintas.*

- 4) Razona con palabras por qué no son equivalentes las afirmaciones de cada uno de los siguientes pares (en las que  $x, y \in \mathbb{R}$ ), y explica cuáles de ellas son ciertas.

- (a)  $\forall x \exists y : (x = 2y \vee x = 2y + 1)$                       no equivale a                       $\exists x : \forall y (x = 2y \vee x = 2y + 1)$  .  
 (b)  $\exists x : \forall y (x < y \wedge y < x + 2)$                       no equivale a                       $\forall x \exists y : (x < y \wedge y < x + 2)$  .

- 5) Explica por qué son equivalentes las dos proposiciones:  $S \wedge R$ ,  $\neg(S \Rightarrow \neg R)$ , ilustrando la explicación con un *diagrama de Venn*. Confírmalo con la *tabla de verdad* de cada una de ellas. Haz lo mismo con las proposiciones:  $S \vee (\neg R) \Rightarrow T$ ,  $(\neg T) \Rightarrow (\neg S) \wedge R$ .

- 6) Halla expresiones para las siguientes sumas, y pruébalas por **inducción**:

- (i) la suma de los  $n$  primeros números naturales:  $0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1)$  ;  
 (ii) la suma de los  $n$  primeros términos de la **progresión aritmética**:  $a + kd, k = 0, 1, \dots, n - 1$  ;  
 (iii) la suma de las  $n$  primeras potencias de  $r$ :  $r^0 + r^1 + \dots + r^{n-1}$  ;  
 (iv) la suma de los  $n$  primeros términos de la **progresión geométrica**:  $cr^k, k = 0, 1, \dots, n - 1$  ;  
 (v) la suma de los ángulos de un polígono de  $n$  lados.

*Indicación: recuerda que los ángulos de un triángulo suman  $\pi$  radianes.*

- 7) Demuestra por inducción sobre  $n \in \mathbb{N}$  las afirmaciones siguientes:

- (a)  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  ;                      (b)  $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}$ , si  $n \geq 1$ .  
 (c)  $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$  ;                      (d)  $2^n > 1 + 2n$ , si  $n > 2$  ;  
 (e)  $2^n > n^2 + 1$ , si  $n > 4$  ;                      (f)  $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}$ , si  $n \geq 2$  .

- 8) Prueba, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , que los números:

$$a_n = 4^n - 1, b_n = 7^n - 4^n \text{ son divisibles por } 3; \quad c_n = 4^n + 6n - 1 \text{ es divisible por } 9.$$

- 9) Demuestra, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , la igualdad:  $(1+q)(1+q^2)(1+q^4) \dots (1+q^{2^n}) = (q^{2^{n+1}} - 1)/(q - 1)$ .

10) Probar que  $\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (k \leq m \Rightarrow \exists p \in \mathbb{N} (p \leq k \wedge p \equiv 1 \pmod{n}))$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



12) Usando la definición del *logaritmo en base b* :  $\log_b(x) = a \Leftrightarrow x = b^a$  y la de ' $\log(x) = \ln(x)$ ', que es el *logaritmo en base e* (llamado *natural* o *neperiano*), prueba que para cada  $x > 0$  se tiene:

$$\log(x) = \log(10) \log_{10}(x) = \log(2) \log_2(x) ; \quad \log_{10}(x) = \log_{10}(2) \log_2(x) .$$

Verifícalas para valores concretos de  $x$  con tu calculadora, y asegúrate de conciliar su notación y la muestra.

13) Demuestra por **reducción al absurdo** que  $\log_3 222$  no puede ser un número racional.

14) Probar, para conjuntos arbitrarios  $S, T, U$  y  $V$ , que son ciertas las siguientes igualdades.

(Atención: los diagramas de Venn son útiles para orientarse, pero la prueba no debe depender de ellos).

- (a)  $(S \setminus T) \cup (T \setminus S) = (S \cup T) \setminus (S \cap T)$       (d)  $(S \setminus T) \times (U \setminus V) = (S \times U) \setminus [(S \times V) \cup (T \times U)]$   
 (b)  $(S \setminus (T \cup U)) = (S \setminus T) \cap (S \setminus U)$       (e)  $(S \cup T) \times V = (S \times V) \cup (T \times V)$   
 (c)  $(S \setminus (T \cap U)) = (S \setminus T) \cup (S \setminus U)$

15) Dados conjuntos  $A, B, C$ , con  $B \subset A$ , explicar en cada caso qué conjuntos  $X$  satisfacen las ecuaciones:

(i)  $\begin{cases} A \cap X = B \\ A \cup X = C \end{cases}$  , si sabemos que  $C \supset A$ .      (ii)  $\begin{cases} A \setminus X = B \\ X \setminus A = C \end{cases}$  , si sabemos que  $A \cap C = \emptyset$  .

16) Razona si, para subconjuntos  $A, B$  del **dominio** de una **función**  $f$  se tendrá o no en general:

- (a)  $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$  ,      (b)  $f(A \cap B) \supset f(A) \cap f(B)$ ,  
 (c)  $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$  ,      (d)  $f(A \cup B) \supset f(A) \cup f(B)$ .

Para cada inclusión, prueba que se cumple o da un contraejemplo.

17) Dadas funciones  $f : X \rightarrow Y$  ,  $g : Y \rightarrow Z$  , probar las siguientes afirmaciones:

- (a)  $f$  inyectiva  $\wedge$   $g$  inyectiva  $\Rightarrow g \circ f$  inyectiva.  
 (b)  $f$  sobre  $\wedge$   $g$  sobre  $\Rightarrow g \circ f$  sobre.  
 (c) Si falta alguna de las dos hipótesis en los casos anteriores, la conclusión puede ser falsa.  
 (d) Si  $g$  es biyectiva,  $g \circ f$  es inyectiva si y sólo si lo es  $f$ , y es sobre si y sólo si lo es  $f$ .  
 (e) Si además es  $X = Z$  , lo mismo es cierto para  $f \circ g$  .

18) Sean  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  las funciones definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 1 - x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ (x - 1)^2 & \text{si } x \geq 0 . \end{cases}$$

- (a) Dibuja los gráficos de las funciones  $f$ ,  $g$ ,  $g \circ f$  y  $f \circ g$ .  
 (b) Halla las imágenes de cada una de esas funciones y explica si son inyectivas y/o suprayectivas.

19) Dada  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x) = |2x + 1/2| - 1/2$  , halla su imagen  $f(\mathbb{R})$ , y también la  $f(\mathbb{Z})$ .  
 ¿Es  $f$  sobre o inyectiva? Prueba que sin embargo sí da una biyección entre  $\mathbb{Z}$  y  $f(\mathbb{Z})$ .

20) ¿Cuáles de las siguientes funciones son **inyectivas**? ¿Cuáles **suprayectivas**? ¿Es alguna **biyectiva**? (Empieza por verificar que esas fórmulas definen funciones entre los conjuntos que se indican).

- (a)  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(m) = m + 2$ ;      (e)  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(n) = n(n + 1)$ ;  
 (b)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(m) = 2m - 7$ ;      (f)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ ;  
 (c)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x - x^3$ ;      (g)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(n) = n^2 + n + 1$ ;  
 (d)  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ ,  $f(x) = x^2 + 4x$ ;      (h)  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ ,  $f(t) = t/(t + 1)$ .

21) Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función. La **imagen inversa** de un subconjunto  $A \subset Y$  se define como:

$$f^{-1}(A) = \{x \in X \mid f(x) \in A\}.$$

Dados subconjuntos  $A, B \subset Y$ , demuestra que

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

