

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

## Descripción de los datos

### Tabla bivariante

Si para cada individuo tenemos dos datos, podemos construir una tabla de doble entrada.

### EJEMPLO

Se han estudiado el peso ( X ) y la altura ( Y ) de 70 individuos obteniéndose los datos de la siguiente tabla (cuantitativa-cuantitativa)



## Descripción de los datos

Pesos / Tallas	159-161	161-163	163-165	165-167	167-169	169-171
48	3	2	2	1	0	0
51	2	3	4	2	2	1
54	1	3	6	8	5	1
57	0	0	1	2	8	3

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

## Descripción de los datos

Pesos / Tallas	159 - 161	161 - 163	163 - 165	165 - 167	167 - 169	169 - 171
48	3	2	2	1	0	0
51	2	3	4	2	2	1
54	1	3	6	8	5	1
57	0	0	1	2	8	3
60	0	0	0	2	4	4

En cada celda tenemos la frecuencia conjunta,  $F_{ij}$ , es decir, el número de individuos que presentan simultáneamente las características  $x_i$  e  $y_j$



## Cuestiones

- Construir la tabla bivalente anterior con las frecuencias relativas
- En una tabla de doble entrada, la suma de todas las frecuencias relativas es ....
- En una tabla de doble entrada, la suma de todas las frecuencias absolutas es ....

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Descripción de los datos

Pesos / Tallas	159 - 161	161 - 163	163 - 165	165 - 167	167 - 169	169 - 171	Total Filas
48	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,11
51	0,03	0,04	0,06	0,03	0,03	0,01	0,20
54	0,01	0,04	0,09	0,11	0,07	0,01	0,34
57	0,00	0,00	0,01	0,03	0,11	0,04	0,20
60	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,14
Total columnas	0,09	0,11	0,19	0,21	0,27	0,13	1,00



## Descripción de los datos

### Distribuciones marginales

- Se obtienen al estudiar una de las variables de forma independiente de la otra.
- La distribución de la variable X se calcula sumando, para cada fila y sobre todas las columnas, las frecuencias conjuntas.
- La distribución de la variable Y se calcula sumando, para cada

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

## Descripción de los datos

Pesos / Tallas	159 – 161	161 – 163	163 – 165	165 – 167	167 – 169	169 – 171	Total Filas
48	3	2	2	1	0	0	8
51	2	3	4	2	2	1	14
54	1	3	6	8	5	1	24
57	0	0	1	2	8	3	14
60	0	0	0	2	4	4	10
Total columnas	6	8	13	15	19	9	70

Frecuencias marginales

$F_Y$

$F_X$



## Descripción de los datos

Pesos	
48	8
51	14
54	24
57	14
60	10

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Cuestiones

- Construir la tabla de frecuencias de la variable PESO
- En una tabla de doble entrada, la suma de las frecuencias marginales relativas de una de las variables es....
- La suma de las frecuencias marginales absolutas de una de las variables es...



## Descripción de los datos

### Distribuciones condicionadas

Se obtienen al estudiar un conjunto más pequeño de los datos formado por aquellos que tienen, por ejemplo, la característica  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, r$ , o la carecterística  $y_j$ ,  $j = 1, \dots, s$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Descripción de los datos

### Distribuciones condicionadas

- Si consideramos los datos que tienen la característica  $Y_j$ , la variable  $X$  definida sobre este conjunto se denomina **variable condicionada** y se suele denotar mediante  $X/Y = Y_j$



## Descripción de los datos

Pesos / Tallas	159 – 161	161 – 163	163 – 165	165 – 167	167 – 169	169 – 171	Total Filas
48	3	2	2	1	0	0	8
51	2	3	4	2	2	1	14
54	1	3	6	8	5	1	24
57	0	0	1	2	8	3	14
60	0	0	0	2	4	4	10
Total columnas	6	8	13	15	19	9	70

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Descripción de los datos

Frecuencias relativas de la TALLA condicionada al PESO=54

$Y X=54$	$f(y_j X=54)$
159 – 161	1/24
161 – 163	3/24
163 – 165	6/24
165 – 167	8/24
167 – 169	5/24
169 – 171	1/24
Total	1



## Descripción de los datos

### Independencia entre variables

- El gran interés de analizar dos variables conjuntamente es conocer si existe o no relaciones entre ellas.
- Los dos casos extremos en la relación entre dos variables son:
  - La ausencia de relación: **Independencia**.  
*El conocimiento de una variable no permite conocer nada sobre la otra variable.*
  - El caso de **dependencia funcional  $Y=f(X)$** .

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



## Descripción de los datos

### Independencia entre variables

- Entre estos dos casos extremos anteriores, existen un tipo de relaciones, que son las que nos van a interesar estudiar en muchos casos:
  - Sabemos que dos variables están relacionadas, pero no existe una dependencia funcional exacta.
- Este es el caso de **dependencia estadística**, en el que se puede describir, aproximadamente, el comportamiento de una variable a partir de otra u otras variables  $Y \approx f(x)$ .



## Descripción de los datos

### Independencia entre variables

- Toda la información sobre la relación entre dos variables la provee la función de distribución conjunta. Además, basada en dicha distribución, existen una serie de medidas que nos van a servir para analizar esta relación.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Descripción gráfica de los datos

La representación más útil para mostrar la relación entre dos variables continuas sin agrupar es el **diagrama de dispersión**.


Cada par  $(x_i, y_j)$  se representa como un punto del plano cartesiano

Gráfico de Talla frente a Peso



## Descripción gráfica de los datos

Del fichero cardata.sf, analizamos los caballos de fuerza (horsepower) de 155 coches frente al gasto de gasolina (mpg = milla por galón)




**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---


**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

## Descripción gráfica de los datos





Relación lineal negativa



Relación lineal positiva



## Descripción gráfica de los datos



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Medidas de dependencia lineal

Las dos medidas más utilizadas para cuantificar el grado y sentido de la dependencia lineal son:

- Covarianza
- Correlación



## Medidas de dependencia lineal

### Covarianza

- Nos indica si la relación entre las variables es positiva o negativa.
- Su magnitud depende de las unidades
- Si las variables son estadísticamente independientes entonces la covarianza es nula (el recíproco no es válido en general)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## Medidas de dependencia lineal

### Covarianza

- Para datos agrupados

$$S_{xy} = \sum_i \sum_j f_{ij} (x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y}) = \left( \sum_i \sum_j f_{ij} x_i y_j \right) - \bar{x} \bar{y}$$

- Para datos no agrupados

$$S_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \bar{x} \bar{y}$$



## Medidas de dependencia lineal

### Correlación

- Mide la magnitud y la dirección de la dependencia lineal.
- Es adimensional.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Medidas de dependencia lineal

### Correlación

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

- Tiene el mismo signo que la covarianza.
- No mide las relaciones no-lineales.



## Medidas de dependencia lineal

### Correlación

- $-1 \leq r_{xy} \leq 1$
- Decimos que las variables son incorreladas  $\Leftrightarrow r = 0$
- Hay relación lineal perfecta  $\Leftrightarrow r = 1$  o  $r = -1$


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Recta de regresión




Buscamos la ecuación de una recta que “aproxime lo mejor posible” a todos los puntos

$(x_i, y_i)$



## Recta de regresión



Si sólo tenemos dos puntos, hay una única recta que pasa por ellos


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99


## Recta de regresión



En este caso es imposible que una recta pase por todos los puntos.  
¿Cuál elijo?

$(x_i, y_i)$

## Recta de regresión



Valor observado  $y_i$

Valor predicho por la recta  $\hat{y}_i$

$(x_i, y_i)$

$e_i$  Error de predicción

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



## Recta de regresión




Buscamos la recta que minimiza los errores de predicción:

$$\min \sum_{i=1}^N e_i^2$$

(recta de mínimos cuadrados)



## Recta de regresión



SOLUCIÓN

$$b = \frac{\text{cov}(x, y)}{s_x^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Observaciones


- La recta de regresión siempre pasa por el punto  $(\bar{x}, \bar{y})$
- La pendiente de la recta es  $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}$ . Por lo que el signo de la covarianza marcará la pendiente de la recta.
- Si la pendiente es positiva (si la covarianza es positiva), valores grandes de la variable X, se relacionarán con valores grandes de la variable Y (dependencia positiva). Y si es negativa valores grandes de la variable X se relacionarán con valores pequeños de Y (dependencia negativa).



## Recta de regresión

### Ejemplo

La variable V1 tiene la velocidad del viento registrada en la localización 1, mientras que la variable V2 tiene las velocidades registradas en esos mismos instantes en la localización 2. Se tiene un total de 115 pares de medidas.



Loc. 1  
media: 2,51  
varianza: 1,91

Loc. 2  
media: 3,28  
varianza: 2,36

cov(V1,V2) = 1,995

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

## Recta de regresión

### Ejemplo

$$b = \frac{\text{cov}(X, Y)}{S_x^2} = \frac{1,995}{1,91} = 1,045$$

$$a = \bar{x} - b\bar{y} = 3,28 - 1,045 \times 2,51 = 0,657$$

$$\hat{V}_2 = 0,657 + 1,045 \times V_1$$

Si, por ejemplo, en la Localización 1 se mide una velocidad de viento de 5 m/s, la predicción en la Localización 2 es de un viento de

$$0.657 + 1.045 \times 5 = 5.88 \text{ m/s}$$



### Ejemplo

- Una multinacional dedicada a la venta de gafas quiere averiguar si existe relación lineal entre el dinero que gasta en anuncios de televisión y sus ventas locales (en miles de euros). Para ello hizo un estudio durante siete meses, obteniendo los siguientes datos

MES	VENTAS	GASTOS
ENERO	50	0.5
FEBRERO	90	0.75
MARZO	30	0.4

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

## Ejemplo

- Averiguar si existe relación lineal entre las variables.
- Calcular la recta de regresión.
- ¿ Cuánto tendrá que gastarse en anuncios para obtener unas ventas de 97.000 euros?

**Cartagena99**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70