

# Resolución numérica de ecuaciones no lineales

Son muchas las situaciones en las que se presenta el problema de obtener las soluciones de ecuaciones de la forma  $f(x) = 0$ . En algunos casos existe una fórmula de resolución, pero existen muchas ecuaciones que no admiten fórmula de resolución. Para este tipo de ecuaciones existen métodos de aproximación a las soluciones. Estos métodos también se usan en ecuaciones en las que, existiendo fórmula de resolución, la solución es un número muy “complicado” y es necesario aproximarla para su manejo. La idea es obtener una sucesión  $x_1, \dots, x_n, \dots$  que converge a un punto  $c$  tal que  $f(c) = 0$ .

Estos métodos se basan en el teorema de Bolzano que asegura la existencia de, al menos, una raíz de una función  $f(x) = 0$  en un cierto intervalo  $[a, b]$ , bajo ciertas condiciones. Si además  $f$  es derivable en  $(a, b)$  y  $f'$  no se anula en dicho intervalo, la raíz es única.

## Teorema de Bolzano

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow and orange gradient bar at the bottom.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

## 1. Método de la bisección

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua y de modo que  $f(a)f(b) < 0$ , para encontrar un punto  $c$  tal que  $f(c) = 0$  se procede como se expone a continuación.

Se evalúa la función  $f$  en el punto medio del intervalo  $[a, b]$ :

Si  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$ , entonces  $c = \frac{a+b}{2}$ .

Si  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$ , elegimos uno de los subintervalos  $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$  o  $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$  en cuyos extremos  $f$  toma valores de signo opuesto. A este intervalo lo denotamos por  $[a_1, b_1]$  y tendrá por longitud la mitad de la del intervalo inicial  $[a, b]$ .

A continuación se considera el intervalo  $[a_1, b_1]$  y se procede de igual modo para obtener el intervalo  $[a_2, b_2]$ .

Reiterando el proceso se tendrá, o bien la raíz exacta, o bien una sucesión de intervalos encajados

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$$

cuya intersección es un punto  $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , que verifica que  $f(c) = 0$ .

Por otro lado, se tiene que cualquier punto del intervalo  $[a_n, b_n]$  proporciona una aproximación de  $c$  con un error menor que la longitud del intervalo. Por lo que, si  $x \in [a_n, b_n]$ ,

$$|c - x| < \frac{1}{2^n}(b - a)$$

El algoritmo consiste en repetir el proceso de subdivisión hasta encontrar  $c$ , o bien llegar a un intervalo de longitud menor que el error admisible.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

### Ejemplo

Obtener la solución aproximada de la ecuación  $e^x + x = 0$  con un error menor que  $\frac{1}{2}10^{-3}$ .

La función  $f(x) = e^x + x$  es continua y derivable en todo  $\mathbb{R}$ . La derivada  $f'(x) = e^x + 1$  es positiva para todo  $x \in \mathbb{R}$ . Por tanto  $f$  tiene como máximo una raíz.

Como  $f(0) = 1 > 0$  y  $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$ , la única raíz de  $f$  está en el intervalo  $[-1, 0]$ .

Evaluamos la función en el punto medio del intervalo,  $f\left(-\frac{1}{2}\right) = e^{-1/2} - \frac{1}{2} > 0$  y como  $f(-1) < 0$ , la raíz se encuentra en  $[a_1, b_1] = \left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ .

El punto medio de este intervalo es  $-\frac{3}{4}$  y  $f\left(-\frac{3}{4}\right) = e^{-3/4} - \frac{3}{4} < 0$  y como  $f\left(-\frac{1}{2}\right) > 0$ , la única raíz de  $f$  está en el intervalo  $\left[-\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}\right]$ .

De esta manera se continúa el proceso dividiendo cada intervalo hasta encontrar la raíz o llegar a un intervalo de longitud menor que  $\frac{1}{2}10^{-3}$ . Como la longitud del intervalo inicial es 1, se deberá repetir el proceso  $n$  veces, con  $n$  verificando que  $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{2}10^{-3}$ , lo que se consigue con  $n > 10,97$ , es decir, con  $n = 11$  o bien con  $n = 10$  si se da como aproximación el punto medio del último intervalo.

A continuación se dan los intervalos obtenidos repitiendo el proceso once veces.

$$[-1, 0]$$

$$[-1, -0,5]$$

$$[-0,75, -0,5]$$

$$[-0,625, -0,5]$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

$$[-0,5703125, -0,5625]$$

$$[-0,5703125, -0,56640625]$$

$$[-0,568359375, -0,56640625]$$


$$[-0,5673828125, -0,56640625]$$

$$[-0,5673828125, -0,5668945312]$$

Por lo que  $-0,567$  es una aproximación a  $c$  con un error menor que  $\frac{1}{2}10^{-3}$ .

## 2. Método de Newton-Raphson

El método de Newton-Raphson se basa en la idea de aproximar una curva por su tangente en un punto. Este método consiste en considerar, en cada iteración  $n - 1$ , la recta tangente a  $f(x)$  en  $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$  y tomar como siguiente aproximación  $x_n$  la intersección de dicha tangente con el eje de abscisas.



Por tanto, teniendo en cuenta que la ecuación de la recta tangente a la gráfica

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

**Cartagena99**

se tiene que

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

### Teorema. Condiciones de convergencia del método de Newton

Sea  $f$  una función continua y dos veces derivable en un conjunto que contenga al intervalo  $[a, b]$ . Supongamos que

- i)  $f(a)f(b) < 0$ .
- ii)  $f''$  tiene signo constante en  $[a, b]$ .

Entonces, si  $x_0 \in [a, b]$  es un punto cualquiera en el que se verifica  $f(x_0)f''(x_0) > 0$ , la sucesión  $(x_n)$  definida por

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

converge al punto  $c$  tal que  $f(c) = 0$ .

Las hipótesis del teorema garantizan que  $f'(x)$  es distinta de cero en un intervalo que contiene a  $c$  y a  $x_0$ .

### Observaciones

- Es el más rápido.
- Puede ser difícil elegir el punto  $x_0$ .
- La acotación del error es complicada.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The text is set against a background of a light blue and orange gradient, with a white shadow effect behind the letters.

### Ejemplo

Obtener la solución aproximada de la ecuación  $e^x + x = 0$ .

La función  $f(x) = e^x + x$  es continua y dos veces derivable en todo  $\mathbb{R}$ .

Si consideramos el intervalo  $[-1, 0]$  se tiene que  $f(0) = 1 > 0$  y  $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$ , por lo que  $f(-1)f(0) < 0$ .

Por otro lado  $f''(x) = e^x > 0$  en todo  $\mathbb{R}$ .

Entonces, tomando como valor inicial  $x_0 = 0$ , ya que  $f(0)f''(0) > 0$ , se cumplen las condiciones del teorema de convergencia, por lo que la sucesión  $(x_n)$  definida por

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

converge al punto  $c$  tal que  $f(c) = 0$ .

A continuación se dan los valores obtenidos en las cinco primeras iteraciones.

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{e^0 + 0}{e^0 + 1} = -0,5$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -0,5 - \frac{e^{-0,5} - 0,5}{e^{-0,5} + 1} = -0,5663110031$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = -0,5663110031 - \frac{e^{-0,5663110031} - 0,5663110031}{e^{-0,5663110031} + 1} = -0,5671431650$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = -0,5671431650 - \frac{e^{-0,5671431650} - 0,5671431650}{e^{-0,5671431650} + 1} = -0,5671432904$$

$$x_5 = x_4 - \frac{f(x_4)}{f'(x_4)} = -0,5671432904 - \frac{e^{-0,5671432904} - 0,5671432904}{e^{-0,5671432904} + 1} = -0,5671432904$$

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99

### 3. Método iterativo del punto fijo

Este método se puede usar cuando sea posible encontrar una función  $g$  que verifique ciertas condiciones y de modo que  $f(x) = 0$  si y sólo si  $g(x) = x$ , por lo que el problema de encontrar una raíz para  $f$  es equivalente a encontrar un punto fijo para  $g$ , es decir, un punto  $c$  tal que  $g(c) = c$ .

#### Teorema. Método del punto fijo

Si  $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$  es continua y contractiva, entonces para cualquier valor inicial  $x_0 \in [a, b]$  el proceso de iteración  $x_n = g(x_{n-1})$  proporciona una sucesión convergente al único punto  $c \in [a, b]$  tal que  $g(c) = c$ .

#### Definición. Aplicación contractiva

Una aplicación  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  se dice que es contractiva si existe  $k \in \mathbb{R}$ , con  $0 < k < 1$ , de modo que

$$|g(x) - g(y)| \leq k |x - y| \quad \text{para todo } x, y \in [a, b].$$

A la constante  $k$  se le denomina constante de contractividad.

**Nota:** Por el teorema del valor medio, si  $g$  es derivable en  $(a, b)$  y existe  $k$  con  $0 < k < 1$  de manera que  $|g'(x)| \leq k$  para todo  $x \in [a, b]$ , entonces  $g$  es contractiva en  $[a, b]$ .

#### Teorema del valor medio

Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$ , entonces existe  $x_0 \in (a, b)$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

### Estimación del error

En las condiciones del teorema del método del punto fijo, si  $k$  es la constante de contractividad de  $g$ , se verifica que

$$|x_n - c| \leq \frac{k}{1 - k} |x_n - x_{n-1}|.$$

**Observación:** Si  $k$  está próximo a 1, el error puede ser grande, aunque  $|x_n - x_{n-1}|$  sea pequeño. El método funciona bien cuando  $k$  es “mucho menor” que 1.

### Ejemplo

Obtener la solución aproximada de la ecuación  $e^x + x = 0$  con un error menor que  $\frac{1}{2}10^{-3}$ .

La función  $f(x) = e^x + x$  es continua.

Si consideramos el intervalo  $[-1, -0,5]$  se tiene que  $f(-0,5) > 0$  y  $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$ , por lo que  $f$  tiene al menos una raíz en el intervalo  $[-1, -0,5]$ . Por otro lado  $f'(x) = e^x + 1 > 0$  en todo  $\mathbb{R}$ , luego  $f$  tiene una única raíz en el intervalo  $[-1, -0,5]$ .

Hay que encontrar una función  $g$  que cumpla las condiciones del teorema del método del punto fijo y tal que  $f(x) = 0 \iff g(x) = x$ . Despejando en la ecuación  $e^x + x = 0$ , se tiene que  $x = -e^x$ . Por tanto, tomamos  $g(x) = -e^x$  que es una función continua. Tenemos que ver también que  $g$  es contractiva, para lo que comprobamos que  $|g'(x)| \leq k$  con  $0 < k < 1$ .

$|g'(x)| = e^x$  no se anula nunca, por lo que los posibles valores extremos en el intervalo  $[-1, -0,5]$  se alcanzarán en los extremos de este intervalo, concretamente,

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

---

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Cartagena99



Tomando como valor inicial  $x_0 = -0,5$  y aplicando el proceso de iteración  $x_n = g(x_{n-1})$  se obtiene una sucesión que converge al único punto  $c \in [-1, -0,5]$  tal que  $g(c) = c$  o, equivalentemente,  $f(x) = 0$ .

Como  $|x_n - c| \leq \frac{k}{1-k}|x_n - x_{n-1}|$  y queremos un error menor que  $\frac{1}{2}10^{-3}$ , es decir,  $|x_n - c| \leq \frac{k}{1-k}|x_n - x_{n-1}| < \frac{1}{2}10^{-3}$  siendo  $k = 0,61$ , se deberá repetir el proceso hasta que  $|x_n - x_{n-1}| < \frac{1-k}{k} \frac{1}{2}10^{-3} = 0,00032436$ .

A continuación se dan los valores obtenidos

$(x_n)$ : -0,5, -0,60653066, -0,54523921, -0,57970309, -0,56006463, -0,57117215, -0,56486295, -0,56843805, -0,56640945, -0,56755963, -0,56690721, -0,5672772, -0,56706735.

$|x_n - x_{n-1}| \approx -0,11, 0,06, 0,03, 0,02, 0,01, 0,006, 0,0,0036, 0,002, 0,001, 0,0006, 0,00037, 0,00021$ .

Luego  $c \approx -0,5671$  redondeando a cuatro dígitos, necesitando  $n = 12$  iteraciones.

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white, star-like shape behind it. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70