

1.- Utilizando la formulación en términos de  $\varepsilon$  y  $\delta$  demostrar:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{3+x} = \frac{1}{2}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{|x|} = 0, \quad (d) \lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0.$$

2.- Discutir la existencia de los límites siguientes y calcular su valor si es posible:

$$\begin{array}{lll} (a) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x^2 - 4} & (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} & (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3 + \operatorname{sen} x)}{(x + \operatorname{sen} x)^2} \\ (d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+x}}{x} & (e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} - x + 1}{\sqrt{x} + x - 1} & (f) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{2-x} - \sqrt{x+4}}{x^2 + 4x + 3} \\ (g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 3^x}{x} & (h) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{x^2 - 4} & (i) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1} \\ (j) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \operatorname{sen} \frac{1}{x} & (k) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}} & (l) \lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x^2} \end{array}$$

Indicación: En el caso (k), puede ser útil recordar que  $\cos x = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 x}$ .

3.- (\*) Demostrar que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ . Utilizar esta propiedad para calcular

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(x^2 - 1)}{x - 1} \quad (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(\tan x)}{x}$$

4.- En las siguientes expresiones, aparece la función *parte entera*, denotada por  $[x]$ , y que representa al mayor número entero que es menor o igual que  $x$ . Discutir la existencia de los límites siguientes y calcular su valor si es posible:

$$\begin{array}{ll} (a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{4} \left[ \frac{3}{x} \right] & (b) \lim_{x \rightarrow 1} x \left[ \frac{3}{x} \right] \\ (c) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{x-1} \right)^{[x]} & (d) \lim_{x \rightarrow 1} \left( \left| \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x - 2} \right|^3 + x^6 - 1 \right)^{[x]} \end{array}$$

5.- Encontrar las constantes  $a$  y  $b$  para las cuales

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - ax - b) = 1.$$

6.- Estudiar si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:

- (a) Si existen los límites  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$ , entonces existe el límite  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ .
- (b) Si no existen los límites  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ , entonces no existe el límite  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$ .



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

7.- Sea  $f(x)$  tal que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ , y sea  $g(x)$  tal que  $|g(x)| < K$  para todo  $x$ . Demostrar que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$ . Estudiar si se puede debilitar de alguna manera la hipótesis sobre  $g$ .

8.- Dibujar la gráfica y estudiar la continuidad de las siguientes funciones donde  $[x]$  denota la parte entera de  $x$ , es decir, el mayor entero menor o igual que  $x$ :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &= [x] & \text{(b)} \quad f(x) &= x - [x] & \text{(c)} \quad f(x) &= \sqrt{x - [x]} \\ \text{(d)} \quad f(x) &= [x] + \sqrt{x - [x]} & \text{(e)} \quad f(x) &= \left[ \frac{1}{x} \right] & \text{(f)} \quad f(x) &= \frac{1}{\left[ \frac{1}{x} \right]} \end{aligned}$$

9.- Estudiar los puntos de discontinuidad y establecer en su caso el tipo de la misma para las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}, & f_2(x) &= \frac{b}{x - b}, & f_3(x) &= x \left[ \frac{1}{x} \right], & f_4(x) &= [\sin x]. \\ f_5(x) &= \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in [a - 1, a), \\ x + a & \text{si } x \in [a, a + 1]. \end{cases} & f_6(x) &= \begin{cases} -|\sin x| - 4 & \text{si } x < \pi, \\ |\cos x| - 5 & \text{si } x \geq \pi. \end{cases} \end{aligned}$$

10.- Se consideran las funciones  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = e^x$ ,  $h(x) = \cos x$ .

a) Escribir la expresión analítica de las funciones  $f \circ g$ ,  $f \circ h + h \circ g$ ,  $f \circ g \circ h$ .

b) Escribir en términos de operaciones con las funciones  $f, g, h$ , las expresiones siguientes:  $y = e^{\cos x}$ ,  $y = \cos(e^x + e^{x^2})$ ,  $y = e^{2x}$ .

11.- (\*) Estudiar si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:

- (a) Si una función de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  alcanza un máximo y un mínimo en todo intervalo cerrado entonces es continua.
- (b) Si una función  $f$  de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  toma **todos** los valores comprendidos entre  $f(a)$  y  $f(b)$  en todo intervalo  $[a, b]$  entonces es continua.
- (c) Si  $f$  es una función de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  continua en 0 y tal que  $f(x + y) = f(x) + f(y)$ , entonces  $f$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

12.- Dar un ejemplo de función definida sobre todos los reales que sólo sea continua en los puntos 0 y 1.

13.- Supóngase que  $f$  y  $g$  son funciones continuas en  $[a, b]$  y que  $f(a) < g(a)$ , pero  $f(b) > g(b)$ . Demostrar que  $f(x) = g(x)$  para algún  $x$  en  $(a, b)$ .

14.- (\*) Supóngase que  $f$  es una función continua en  $[0, 1]$  y que  $f(x)$  está en  $[0, 1]$  para todo  $x$ . Demostrar que  $f(x) = x$  para algún  $x$  en  $[0, 1]$ .

15.- Demostrar que las siguientes ecuaciones tienen solución:

$$\text{(a)} \quad x - \sin x - 5 = 0, \quad \text{(b)(*)} \quad x^7 + \frac{213}{2 + x^2 + \tan^2 x} = 12, \quad \text{(c)(*)} \quad \frac{x}{4} = x - [x].$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE  
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

---

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS  
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70