

APELLIDOS:

NOMBRE:

PARCIAL I (24/3/2014) Puntuación 40 %

1. Calcular, si existen, los siguientes límites:

a) (0.5 puntos) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \frac{n!}{\sqrt[n]{n}}$ no existe porque las subsecuencias $\{a_{2n}\}$ y $\{a_{2n-1}\}$ tienen límites distintos:
 Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, resulta que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n} = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n-1} = -\infty$.

b) (1 punto) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{\sqrt{2n^4+1}} + \frac{n}{\sqrt{2n^4+2}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{2n^4+n}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Denotando $b_n = \frac{n}{\sqrt{2n^4+1}}$ y $c_n = \frac{n}{\sqrt{2n^4+n}}$, se consideran las sucesiones
 $a_n = n \cdot \frac{n}{\sqrt{2n^4+n}} = \frac{n^2}{\sqrt{2n^4+n}} = \frac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{n^3}}}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $c_n = n \cdot \frac{n}{\sqrt{2n^4+1}} = \frac{n^2}{\sqrt{2n^4+1}} = \frac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{n^4}}}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 Aplicando la regla del sandwich, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

c) (1 punto) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{\ln(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{\ln(n+1)}{n+1}}$
 $= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{n+1}} = e^0 = 1$
 $\ln(n+1) \ll n+1$

2. (1.5 puntos) Estudiar la convergencia de la sucesión $\{a_n\}$, definida por $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{1}{6}(a_n^2 + 8), n \geq 1 \end{cases}$

En caso afirmativo, calcular su límite.

i) $\{a_n\}$ estrictamente creciente:
 • Si $n=1$, $a_1 = 1 < \frac{1}{6}(1^2 + 8) = a_2$
 • Si $a_n < a_{n+1}$, entonces $a_n^2 < a_{n+1}^2 \Rightarrow a_n^2 + 8 < a_{n+1}^2 + 8 \Rightarrow \frac{1}{6}(a_n^2 + 8) < \frac{1}{6}(a_{n+1}^2 + 8)$
 $\Rightarrow a_{n+1} < a_{n+2}$
 luego $a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$, entonces $L = \frac{1}{6}(L^2 + 8)$, cuyas soluciones son $L=2, L=4$.

iii) $\{a_n\}$ acotada superiormente por 2:
 • Si $n=1$, $a_1 = 1 \leq 2$
 • Si $a_n \leq 2$, entonces $a_n^2 \leq 4 \Rightarrow a_n^2 + 8 \leq 12 \Rightarrow \frac{1}{6}(a_n^2 + 8) \leq 2 \Rightarrow a_{n+1} \leq 2$
 luego $a_n \leq 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

De i) y iii) se deduce que $\{a_n\}$ converge.
 De ii) se deduce que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2$.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

4. (1.5 puntos) Estudiar la convergencia y la convergencia absoluta de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n+1}}{n}$.

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

$a_n > a_{n+1} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{n+1}}{n} > \frac{\sqrt{n+2}}{n+1} \Leftrightarrow \frac{n+1}{n^2} > \frac{n+2}{(n+1)^2} \Leftrightarrow (n+1)^2 > n^2 + 3n + 2$
 $n^2 + 2n + 1 > n^2 + 3n + 2 \Leftrightarrow n^2 + 3n + 1 > n^2 + 2n + 2 \Leftrightarrow n > 1$ Cierto $\forall n$.
 Luego la serie converge ∞ aplicando el criterio de Leibniz.

5. (2 puntos) Dada la serie de potencias $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{3^n(n^3 - 4n)} x^n$, se pide:

a) Hallar su radio y su campo de convergencia.

b) Obtener, si es posible, su suma en $x = 3$.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{4}{3^n(n^3 - 4n)} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \sqrt[n]{4}}{3 \sqrt[n]{n^3 - 4n}} = \frac{1}{3} = L \Rightarrow r = 3$
 Luego la serie de potencias converge absolut. en $(-3, 3)$ y no converge en $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$
 Si $x = 3$, $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{n^3 - 4n}$, que es convergente por C.C. Límite con $\sum \frac{1}{n^3}$, que converge (por ser p-serie con $p = 3 > 1$):
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^3 - 4n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3}{n^3 - 4n} = 4 \neq 0, +\infty$.
 Si $x = -3$, $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n 4}{n^3 - 4n}$ conv. abs por $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{n^3 - 4n}$ converge.
 El campo de convergencia es $[-3, 3]$



b) $\frac{4}{n^3 - 4n} = \frac{-1}{n} + \frac{1/2}{n+2} + \frac{1/2}{n-2}$;
 $S_n = \sum_{k=3}^n \left(\frac{-1}{k} + \frac{1/2}{k+2} + \frac{1/2}{k-2} \right) = - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n-2} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right)$
 $+ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n-2} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right)$
 $+ \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n-2} \right)$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{11}{24}$, que es la suma de la serie en $x = 3$.

6. (1.5 puntos) Dada la función $f(x, y) = \sqrt{x-2} \ln(6x - x^2 - y^2 - 5)$, se pide:

a) Representar gráficamente el dominio D de la función f .

b) Representar gráficamente el interior de D y la frontera de D . Razonar si D es un conjunto compacto.

a) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x-2 \geq 0, 6x - x^2 - y^2 - 5 > 0\}$
 $= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 2, (x-3)^2 + y^2 < 4\}$.



D es conjunt acotado
 D no es conjunt cerrado por $\text{Fr}(D) \not\subset D: (5,0) \in \text{Fr}(D)$, pero $(5,0) \notin D$
 luego D no es conjunt compacto.